


Résumé du quiz




Statistiques		
Score le plus bas 29%	Médiane 79%	Score le plus élevé 93%
Moyenne: 71%		
Écart-type: 17%		

Classement des questions

QUESTIONS (5)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q3 A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de méthylphénidate nécessite	1	62%
Q7 Le médecin traitant	2	63%
Q6 Le médecin qui rédige la prescription mensuelle de méthylphénidate, après la prescription initiale	3	77%
Q5 La prescription du Méthylphénidate	4	83%
Q4 Chez un enfant ou un adolescent traité par Méthylphénidate	5	89%

Q3 A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de méthylphénidate nécessite


Réponses obtenues : 28 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz							
Pourcentage de réponses correctes 4%		Score moyen 1.9/3.0 (62%)		Écart-type 0.45		Difficulté 1/5	
	UN CONTRÔLE RÉGULIER DES FONCTIONS HÉPATIQUES ET RÉNALES.	✓ UN AVIS CARDIOLOGIQUE PRÉALABLE EN CAS D'ANTÉCÉDENTS DE TROUBLE DU RYTHME OU DE LA CONDUCTION CARDIAQUE	UN ARRÊT DU TRAITEMENT EN CAS D'ANOREXIE MÊME LIMITÉE AU REPAS DU MIDI	✓ D'ADAPTER LA POSOLOGIE EN FONCTION DE L'EFFICACITÉ ET DE LA TOLÉRANCE	✓ DE NE PAS DÉPASSER LA POSOLOGIE DE 2 MG/KG/JOUR	TOTAL	
PretestMPH07.09.22	7.14% 1	78.57% 11	0.00% 0	100.00% 14	21.43% 3	103.57% 29	
PosttestMPH 07.09.22	0.00% 0	78.57% 11	0.00% 0	92.86% 13	0.00% 0	85.71% 24	
Nombre total de participants	1	22	0	27	3	28	

Q4 Chez un enfant ou un adolescent traité par Méthylphénidate

Réponses obtenues : 28 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes	Score moyen	Écart-type	Difficulté	
89%	0.9/1.0 (89%)	0.31	5/5	

	LA SURVENUE D'UN TROUBLE D'ENDORMISSEMENT EST RARE ET JUSTIFIE L'ARRÊT DU TRAITEMENT	LA SURVENUE DE CÉPHALÉES EN FIN DE JOURNÉE IMPOSE L'ARRÊT DU TRAITEMENT POUR UNE RÉ ÉVALUATION PLUS COMPLÈTE DE LA SITUATION	LA PERTE D'APPÉTIT QUAND ELLE EST LIÉE AU TRAITEMENT SURVIENT SUR LES QUATRE REPAS DE LA JOURNÉE	✓ LES DIFFICULTÉS D'ENDORMISSEMENT SONT FRÉQUENTES ET PEUVENT ÊTRE AMÉLIORÉES PAR UNE SUPPLÉMENTATION PAR MÉLATONINE	LA SUPPLÉMENTATION PAR MÉLATONINE EXIGE EN CAS DE TROUBLE D'ENDORMISSEMENT DE RECOURIR À LA PRESCRIPTION D'UNE FORME À LIBÉRATION RETARDÉE	TOTAL
PretestMPH07.09.22	7.14% 1	28.57% 4	14.29% 2	78.57% 11	28.57% 4	78.57% 22
PosttestMPH 07.09.22	0.00% 0	0.00% 0	7.14% 1	100.00% 14	0.00% 0	53.57% 15
Nombre total de participants	1	4	3	25	4	28

Q5 La prescription du Méthylphénidate

Réponses obtenues : 28 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
64%

Score moyen
2.5/3.0 (83%)


Écart-type
0.79

Difficulté
4/5

	SE FAIT POUR UNE DURÉE DE 28 JOURS, AVEC RENOUVELLEMENT AUTORISÉ JUSQU'À DEUX FOIS.	✓ SE FAIT SUR ORDONNANCE SÉCURISÉE	✓ NÉCESSITE D'INSCRIRE LE NOM DE LA PHARMACIE SUR L'ORDONNANCE	PEUT SE FAIRE POUR UNE DURÉE DE TROIS MOIS, ÉVENTUELLEMENT RENOUVELABLE UNE FOIS	✓ NÉCESSITE D'INSCRIRE SUR L'ORDONNANCE LE NOMBRE DE LIGNES DE PRESCRIPTION	TOTAL
PretestMPH07.09.22	35.71% 5	92.86% 13	50.00% 7	14.29% 2	64.29% 9	128.57% 36
PosttestMPH 07.09.22	0.00% 0	100.00% 14	92.86% 13	0.00% 0	100.00% 14	146.43% 41
Nombre total de participants	5	27	20	2	23	28

Q6 Le médecin qui rédige la prescription mensuelle de méthylphénidate, après la prescription initiale

Réponses obtenues : 28 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
57%

Score moyen
2.3/3.0 (77%)


Écart-type
0.90

Difficulté
3/5

	✓ PEUT MODIFIER LA PRÉSENTATION GALÉNIQUE	DOIT RESPECTER STRICTEMENT LE DÉTAIL ET LE LIBELLÉ DE LA PRIMO PRESCRIPTION HOSPITALIÈRE	✓ PEUT MODIFIER LA DOSE PRESCRITE	DOIT ARRÊTER LE TRAITEMENT POUR LES VACANCES SCOLAIRES	✓ PEUT RÉDIGER UNE ORDONNANCE AVANT 28 JOURS EN MENTIONNANT «CHEVAUCHEMENT AUTORISÉ».	TOTAL
PretestMPH07.09.22	57.14% 8	28.57% 4	78.57% 11	7.14% 1	57.14% 8	114.29% 32
PosttestMPH 07.09.22	85.71% 12	0.00% 0	92.86% 13	0.00% 0	92.86% 13	135.71% 38
Nombre total de participants	20	4	24	1	21	28

Q7 Le médecin traitant

Réponses obtenues : 26 Question(s) ignorée(s) : 2



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
7%

Score moyen
2.5/4.0 (63%)

Écart-type
0.91

Difficulté
2/5

	✓ NE DOIT PAS DÉPASSER UNE DOSE DE 60 MG SANS EN INFORMER LE MÉDECIN PRIMO-PRESCRIPTEUR	✓ EN CAS D'EFFET SECONDAIRE, PEUT PASSER À L'AUTRE (EXEMPLE DU CONCERTA® AU QUASYM®) CAR LES EFFETS SECONDAIRES NE SONT PAS TOUJOURS LES MÊMES	✓ PEUT AUGMENTER LA DOSE SANS EN INFORMER LE MÉDECIN SPÉCIALISTE PRIMO-PRESCRIPTEUR.	DOIT BAISSER LA DOSE EN CAS D'ANOREXIE	✓ PEUT PASSER À UNE FORME NON-RETARD EN CAS D'EFFET SECONDAIRE EN FIN DE JOURNÉE (TROUBLE D'ENDORMISSEMENT PAR EXEMPLE).	TOTAL
PretestMPH07.09.22	75.00% 9	41.67% 5	41.67% 5	50.00% 6	66.67% 8	126.92% 33
PosttestMPH 07.09.22	71.43% 10	85.71% 12	64.29% 9	64.29% 9	50.00% 7	180.77% 47
Nombre total de participants	19	17	14	15	15	26