


Quizz Pré Post test Méthylphénidate 2024

Résumé du quiz



Statistiques

Score le plus bas
36%

Médiane
64%

Score le plus élevé
100%

Moyenne: 67%


Écart-type: 20%

Classement des questions

QUESTIONS (5)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q6 Le médecin qui rédige la prescription mensuelle de méthylphénidate, après la prescription initiale	1	55%
Q7 Le médecin traitant	2	55%
Q5 La prescription du Méthylphénidate	3	71%
Q4 Chez un enfant ou un adolescent traité par Méthylphénidate	4	86%
Q3 A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de méthylphénidate nécessite	5	86%

Q4 Chez un enfant ou un adolescent traité par Méthylphénidate

Réponses obtenues : 14 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
86%

Score moyen
0.9/1.0 (86%)

Écart-type
0.36

Difficulté
4/5


CHOIX DE RÉPONSES

	SCORE	RÉPONSES
La survenue d'un trouble d'endormissement est rare et justifie l'arrêt du traitement	0/1	7.14% 1
La survenue de céphalées en fin de journée impose l'arrêt du traitement pour une réévaluation plus complète de la situation	0/1	14.29% 2
La perte d'appétit quand elle est liée au traitement survient sur les quatre repas de la journée	0/1	0.00% 0
✓ Les difficultés d'endormissement sont fréquentes et peuvent être améliorées par une supplémentation par Mélatonine	1/1	85.71% 12
La supplémentation par Mélatonine exige en cas de trouble d'endormissement de recourir à la prescription d'une forme à libération retardée	0/1	14.29% 2

Nombre total de participants: 14

Q5 La prescription du Méthylphénidate

Réponses obtenues : 14 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
36%

Score moyen
2.1/3.0 (71%)


Écart-type
0.77

Difficulté
3/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Se fait pour une durée de 28 jours, avec renouvellement autorisé jusqu'à deux fois.	0/3	14.29% 2
✓ Se fait sur ordonnance sécurisée	1/3	100.00% 14
✓ Nécessite d'inscrire le nom de la pharmacie sur l'ordonnance	1/3	71.43% 10
Peut se faire pour une durée de trois mois, éventuellement renouvelable une fois	0/3	0.00% 0
✓ Nécessite d'inscrire sur l'ordonnance le nombre de lignes de prescription	1/3	42.86% 6
Nombre total de participants: 14		

Q6 Le médecin qui rédige la prescription mensuelle de méthylphénidate, après la prescription initiale

Réponses obtenues : 14 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
21%

Score moyen
1.6/3.0 (55%)


Écart-type
1.01

Difficulté
1/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ Peut modifier la présentation galénique	1/3	42.86% 6
Doit respecter strictement le détail et le libellé de la primo prescription hospitalière	0/3	35.71% 5
✓ Peut modifier la dose prescrite	1/3	57.14% 8
Doit arrêter le traitement pour les vacances scolaires	0/3	7.14% 1
✓ Peut rédiger une ordonnance avant 28 jours en mentionnant «chevauchement autorisé».	1/3	64.29% 9
Nombre total de participants: 14		

Q7 Le médecin traitant

Réponses obtenues : 14 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
36%

Score moyen
2.2/4.0 (55%)

Écart-type
1.42

Difficulté
2/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ Ne doit pas dépasser une dose de 60 mg sans en informer le médecin primo-prescripteur	1/4	71.43% 10
✓ En cas d'effet secondaire, peut passer d'une forme commerciale à l'autre (exemple du Concerta® au Quasym®) car les effets secondaires ne sont pas toujours les mêmes	1/4	50.00% 7
✓ Peut augmenter la dose sans en informer le médecin spécialiste primo-prescripteur.	1/4	50.00% 7
Doit baisser la dose en cas d'anorexie	0/4	7.14% 1
✓ Peut passer à une forme non-retard en cas d'effet secondaire en fin de journée (trouble d'endormissement par exemple).	1/4	50.00% 7
Nombre total de participants: 14		