


Résumé du quiz



Statistiques

Score le plus bas
58%

Médiane
67%

Score le plus élevé
78%

Moyenne: 66%

Écart-type: 7%

Classement des questions

Quizz La peau de l'adolescent

| QUESTIONS (24) | DIFFICULTÉ | SCORE MOYEN |
|---|------------|-------------|
| Q12 Isotrétinoïne : Prescriptions hors AMM . Peut être utilisée : | 1 | 30% |
| Q23 La teigne du cuir chevelu est le plus souvent alopeciante chez le grand ado | 1 | 30% |
| Q14 Toxicité de l'isotrétinoïne : L'isotrétinoïne a-t-elle les effets secondaires suivants | 3 | 45% |
| Q10 Propriétés pharmacologiques de l'isotrétinoïne ? | 4 | 47% |
| Q5 L'hyperpilosité ethnique se révèle surtout à l'adolescence. | 5 | 50% |
| Q6 L'acné est normale et obligatoire chez l'adolescent. | 6 | 60% |
| Q24 Pour les ongles quelles sont les propositions vraies? | 7 | 63% |
| Q20 Une alopecie du vertex isolée chez l'adolescente doit faire craindre un hyperandrogénisme | 8 | 70% |
| Q26 Les condylomes chez l'adolescent sont le plus souvent des auto-contaminations (verrues des mains). | 8 | 70% |
| Q11 Prescription de l'isotrétinoïne. Le pédiatre peut : | 10 | 75% |
| Q16 Le vitiligo non segmentaire de l'enfant est considéré comme une maladie auto immune : | 11 | 80% |
| Q17 On évoque une pelade universelle devant une alopecie inflammatoire | 11 | 80% |
| Q22 La pelade est classée parmi les alopecies acquises non cicatricielles. | 11 | 80% |
| Q25 Quelles propositions sont vraies concernant les verrues génitales de l'adolescent? | 14 | 83% |
| Q3 L'hyperhidrose (ou hyperhidrose) débute le plus souvent à l'adolescence | 15 | 90% |
| Q7 Se méfier d'un érythème pudique, il peut révéler une photodermatose comme une lucite. | 15 | 90% |
| Q9 Pour une acné localisée uniquement sur le front et constituée essentiellement de comédons et microkystes associés à quelques excoriations. Vous proposez comme traitement de première intention : | 15 | 90% |
| Q18 L'onchomadèse est une pathologie unguéale souvent post-infectieuse pouvant aller jusqu'à la perte totale des ongles : | 15 | 90% |
| Q19 L'alopecie androogénique débute le plus souvent dans l'adolescence. | 15 | 90% |
| Q21 Tous les jours l'adolescent perd entre 10 et 100 cheveux, physiologiquement | 15 | 90% |
| Q15 Eléments faisant partie des critères de la neurofibromatose de type 1 (NF1) chez l'enfant ? | 21 | 95% |
| Q4 Les vergetures sont fréquentes chez les adolescents et témoignent de la croissance rapide du corps (inadaptation de l'extension cutanée). | 22 | 100% |
| Q8 Quelles lésions observe-t-on dans une acné juvénile ? | 22 | 100% |
| Q13 Concernant le traitement de l'acné par Isotrétinoïne per os, quelles sont les affirmations exactes ? | 22 | 100% |

Q1 Prénom

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0

Q2 Nom

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0

Q3 L'hyperhidration (ou hyperhidrose) débute le plus souvent à l'adolescence

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
90%

Score moyen
0.9/1.0 (90%)

Écart-type
0.32

Difficulté
15/24

| CHOIX DE RÉPONSES | SCORE | RÉPONSES | |
|-------------------|-------|----------|-----------|
| ✓ Vrai | 1/1 | 90.00% | 9 |
| Faux | 0/1 | 10.00% | 1 |
| TOTAL | | | 10 |

Q4 Les vergetures sont fréquentes chez les adolescents et témoignent de la croissance rapide du corps (inadaptation de l'extension cutanée).

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
22/24

| CHOIX DE RÉPONSES | SCORE | RÉPONSES | |
|-------------------|-------|----------|-----------|
| ✓ vrai | 1/1 | 100.00% | 10 |
| Faux | 0/1 | 0.00% | 0 |
| TOTAL | | | 10 |

Q5 L'hyperpilosité ethnique se révèle surtout à l'adolescence.

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
50%

Score moyen
0.5/1.0 (50%)


Écart-type
0.53

Difficulté
5/24

| CHOIX DE RÉPONSES | SCORE | RÉPONSES | |
|-------------------|-------|----------|-----------|
| Vrai | 0/1 | 50.00% | 5 |
| ✓ Faux | 1/1 | 50.00% | 5 |
| TOTAL | | | 10 |

Q6 L'acné est normale et obligatoire chez l'adolescent.

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
60%

Score moyen
1.8/3.0 (60%)


Écart-type
1.55

Difficulté
6/24

| CHOIX DE RÉPONSES | SCORE | RÉPONSES | |
|-------------------|-------|----------|-----------|
| Vrai | 0/3 | 40.00% | 4 |
| ✓ Faux | 3/3 | 60.00% | 6 |
| TOTAL | | | 10 |

Q7 Se méfier d'un érythème pudique, il peut révéler une photodermatose comme une lucite.

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
90%

Score moyen
0.9/1.0 (90%)


Écart-type
0.32

Difficulté
15/24

| CHOIX DE RÉPONSES | SCORE | RÉPONSES | |
|-------------------|-------|----------|-----------|
| Vrai | 0/1 | 10.00% | 1 |
| ✓ Faux | 1/1 | 90.00% | 9 |
| TOTAL | | | 10 |

Q8 Quelles lésions observe-t-on dans une acné juvénile ?

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
22/24

| CHOIX DE RÉPONSES | SCORE | RÉPONSES |
|--|-------|------------|
| ✓ Toujours des lésions rétentionnelles (points noirs, microkystes) | 1/1 | 100.00% 10 |
| Toujours des lésions inflammatoires (papules, pustules) | 0/1 | 40.00% 4 |
| Des furoncles du visage | 0/1 | 10.00% 1 |
| Des kystes axillaires | 0/1 | 0.00% 0 |
| Une folliculite du cuir chevelu | 0/1 | 10.00% 1 |
| Nombre total de participants: 10 | | |

Q9 Pour une acné localisée uniquement sur le front et constituée essentiellement de comédons et microkystes associés à quelques excoriations. Vous proposez comme traitement de première intention :

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
80%

Score moyen
1.8/2.0 (90%)


Écart-type
0.42

Difficulté
15/24

| CHOIX DE RÉPONSES | SCORE | RÉPONSES | |
|--|-------|----------|---|
| de l'érythromycine en application locale. vrai/faux | 0/2 | 0.00% | 0 |
| ✓ un rétinoïde local. vrai/faux | 1/2 | 90.00% | 9 |
| du peroxyde de benzoyl. | 0/2 | 80.00% | 8 |
| de la doxycycline per os associée à de l'érythromycine locale. | 0/2 | 0.00% | 0 |
| de l'isotrétinoïne orale. vrai/faux | 0/2 | 0.00% | 0 |
| de se couper les cheveux. vrai/faux | 0/2 | 10.00% | 1 |
| ✓ d'arrêter de se tripoter ses lésions | 1/2 | 90.00% | 9 |
| Nombre total de participants: 10 | | | |

Q10 Propriétés pharmacologiques de l'isotrétinoïne ?

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
0%

Score moyen
1.4/3.0 (47%)


Écart-type
0.52

Difficulté
4/24

| CHOIX DE RÉPONSES | SCORE | RÉPONSES | |
|---|-------|----------|---|
| ✓ Anti-inflammatoire | 1/3 | 60.00% | 6 |
| ✓ Réduit l'aspect gras du visage | 1/3 | 10.00% | 1 |
| Réduit la pilosité en cas d'hyperandrogénisme | 0/3 | 0.00% | 0 |
| ✓ Réduit les phénomènes rétentionnels | 1/3 | 70.00% | 7 |
| Nombre total de participants: 10 | | | |

Q11 Prescription de l'isotrétinoïne. Le pédiatre peut :

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
50%

Score moyen
1.5/2.0 (75%)


Écart-type
0.53

Difficulté
10/24

| CHOIX DE RÉPONSES | SCORE | RÉPONSES | |
|--|-------|----------|---|
| Initier le traitement | 0/2 | 0.00% | 0 |
| Modifier les doses. | 0/2 | 10.00% | 1 |
| ✓ Renouveler le traitement | 1/2 | 70.00% | 7 |
| ✓ Arrêter le traitement. | 1/2 | 80.00% | 8 |
| Ré-initier pour une seconde cure, si nécessité | 0/2 | 0.00% | 0 |
| Nombre total de participants: 10 | | | |

Q12 Isotrétinoïne : Prescriptions hors AMM . Peut être utilisée :

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
0%

Score moyen
1.5/5.0 (30%)


Écart-type
1.08

Difficulté
1/24

| CHOIX DE RÉPONSES | SCORE | RÉPONSES | |
|---|-------|----------|---|
| ✓ En 1ère intention dans l'acné | 1/5 | 40.00% | 4 |
| ✓ La maladie de Verneuil | 1/5 | 60.00% | 6 |
| ✓ La cellulite disséquante | 1/5 | 0.00% | 0 |
| ✓ L'acné rosacée | 1/5 | 20.00% | 2 |
| Les ichtyoses | 0/5 | 20.00% | 2 |
| ✓ Au long cours, en cas d'acné « récidivante ». | 1/5 | 30.00% | 3 |
| La dermite péri-orale | 0/5 | 0.00% | 0 |
| Nombre total de participants: 10 | | | |

Q13 Concernant le traitement de l'acné par Isotrétinoïne per os, quelles sont les affirmations exactes ?

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)

Écart-type
0.00


Difficulté
22/24

CHOIX DE RÉPONSES

| | SCORE | RÉPONSES |
|---|-------|------------|
| Vous décidez de prescrire un traitement par isotrétinoïne chez une jeune fille de 12 ans ménarche depuis 2 mois. Une contraception n'est pas indispensable puisqu'elle affirme (et sa mère confirme) ne pas avoir de rapports sexuels ? | 0/1 | 10.00% 1 |
| Lors d'un traitement par isotrétinoïne chez une jeune fille de 16 ans, un test urinaire de grossesse mensuel doit être réalisé ? | 0/1 | 40.00% 4 |
| ✓ En cas de traitement par isotrétinoïne à dose pleine, chez un jeune homme, le traitement peut être renouvelé pour 3 mois ? | 1/1 | 100.00% 10 |
| La surveillance du bilan lipidique et hépatique doit être réalisée tous les 3 mois ? | 0/1 | 60.00% 6 |
| Pour éviter une poussée inflammatoire en début de traitement par isotrétinoïne, un traitement par cycline peut y être associé le 1er mois ? | 0/1 | 50.00% 5 |
| Afin d'assurer la contraception efficace, en cas de traitement par isotrétinoïne, la pilule Diane 35 peut être utilisée | 0/1 | 20.00% 2 |
| Nombre total de participants: 10 | | |

Q14 Toxicité de l'isotrétinoïne : L'isotrétinoïne a-t-elle les effets secondaires suivants

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
0%

Score moyen
2.7/6.0 (45%)


Écart-type
0.48

Difficulté
3/24

| CHOIX DE RÉPONSES | SCORE | RÉPONSES | |
|---|-------|----------|----|
| ✓ Tératogène | 1/6 | 100.00% | 10 |
| ✓ Peut être responsable de dyspareunies | 1/6 | 20.00% | 2 |
| ✓ Réduit la vision nocturne | 1/6 | 0.00% | 0 |
| ✓ Est alopeciant | 1/6 | 0.00% | 0 |
| ✓ Peut donner des myalgies | 1/6 | 50.00% | 5 |
| ✓ Photosensibilisant | 1/6 | 100.00% | 10 |
| Nombre total de participants: 10 | | | |

Q15 Eléments faisant partie des critères de la neurofibromatose de type 1 (NF1) chez l'enfant ?

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
90%

Score moyen
1.9/2.0 (95%)


Écart-type
0.32

Difficulté
21/24

| CHOIX DE RÉPONSES | SCORE | RÉPONSES | |
|--|-------|----------|----|
| Présence d'au moins 3 taches café au lait de 5 mm | 0/2 | 10.00% | 1 |
| ✓ Lentigines dans les régions axillaires ou inguinales | 1/2 | 90.00% | 9 |
| ✓ Un parent du premier degré porteur d'une NF1 | 1/2 | 100.00% | 10 |
| Nombre total de participants: 10 | | | |

Q16 Le vitiligo non segmentaire de l'enfant est considéré comme une maladie auto immune :

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
80%

Score moyen
0.8/1.0 (80%)


Écart-type
0.42

Difficulté
11/24

| CHOIX DE RÉPONSES | SCORE | RÉPONSES | |
|-------------------|-------|----------|-----------|
| ✓ Vrai | 1/1 | 80.00% | 8 |
| Faux | 0/1 | 20.00% | 2 |
| TOTAL | | | 10 |

Q17 On évoque une pelade universelle devant une alopécie inflammatoire

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
80%

Score moyen
0.8/1.0 (80%)


Écart-type
0.42

Difficulté
11/24

| CHOIX DE RÉPONSES | SCORE | RÉPONSES | |
|-------------------|-------|----------|-----------|
| Vrai | 0/1 | 20.00% | 2 |
| ✓ Faux | 1/1 | 80.00% | 8 |
| TOTAL | | | 10 |

Q18 L'onychomadèse est une pathologie unguéale souvent post-infectieuse pouvant aller jusqu'à la perte totale des ongles :

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
90%

Score moyen
0.9/1.0 (90%)


Écart-type
0.32

Difficulté
15/24

| CHOIX DE RÉPONSES | SCORE | RÉPONSES | |
|-------------------|-------|----------|-----------|
| ✓ Vrai | 1/1 | 90.00% | 9 |
| Faux | 0/1 | 10.00% | 1 |
| TOTAL | | | 10 |

Q19 L'alopecie androogénique débute le plus souvent dans l'adolescence.

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
90%

Score moyen
0.9/1.0 (90%)


Écart-type
0.32

Difficulté
15/24

| CHOIX DE RÉPONSES | SCORE | RÉPONSES | |
|-------------------|-------|----------|-----------|
| ✓ Vrai | 1/1 | 90.00% | 9 |
| Faux | 0/1 | 10.00% | 1 |
| TOTAL | | | 10 |

Q20 Une alopecie du vertex isolée chez l'adolescente doit faire craindre un hyperandrogénisme

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
70%

Score moyen
0.7/1.0 (70%)


Écart-type
0.48

Difficulté
8/24

| CHOIX DE RÉPONSES | SCORE | RÉPONSES | |
|-------------------|-------|----------|-----------|
| Vrai | 0/1 | 30.00% | 3 |
| ✓ Faux | 1/1 | 70.00% | 7 |
| TOTAL | | | 10 |

Q21 Tous les jours l'adolescent perd entre 10 et 100 cheveux, physiologiquement

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
90%

Score moyen
0.9/1.0 (90%)


Écart-type
0.32

Difficulté
15/24

| CHOIX DE RÉPONSES | SCORE | RÉPONSES | |
|-------------------|-------|----------|-----------|
| ✓ Vrai | 1/1 | 90.00% | 9 |
| Faux | 0/1 | 10.00% | 1 |
| TOTAL | | | 10 |

Q22 La pelade est classée parmi les alopecies acquises non cicatricielles.

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
80%

Score moyen
0.8/1.0 (80%)


Écart-type
0.42

Difficulté
11/24

| CHOIX DE RÉPONSES | SCORE | RÉPONSES | |
|-------------------|-------|----------|-----------|
| ✓ Vrai | 1/1 | 80.00% | 8 |
| Faux | 0/1 | 20.00% | 2 |
| TOTAL | | | 10 |

Q23 La teigne du cuir chevelu est le plus souvent alopeciante chez le grand ado

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
30%

Score moyen
0.3/1.0 (30%)


Écart-type
0.48

Difficulté
1/24

| CHOIX DE RÉPONSES | SCORE | RÉPONSES | |
|-------------------|-------|----------|-----------|
| Vrai | 0/1 | 70.00% | 7 |
| ✓ Faux | 1/1 | 30.00% | 3 |
| TOTAL | | | 10 |

Q24 Pour les ongles quelles sont les propositions vraies?

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
0%

Score moyen
1.9/3.0 (63%)

Écart-type
0.32


Difficulté
7/24

CHOIX DE RÉPONSES

| CHOIX DE RÉPONSES | SCORE | RÉPONSES |
|--|-------|------------|
| ✓ L'onychophagie et la trichotillomanie sont le plus souvent liées à des troubles anxieux. | 1/3 | 90.00% 9 |
| La mélanonychie acquise de l'adolescent est souvent un mélanome | 0/3 | 0.00% 0 |
| L'onychomycose de l'hallux doit toujours être traitée par l'association d'antifongiques oraux et locaux. | 0/3 | 90.00% 9 |
| La vitesse de pousse de l'ongle varie avec l'âge | 0/3 | 70.00% 7 |
| ✓ La vitesse de pousse de l'ongle est la même quel que soit le doigt ou l'orteil | 1/3 | 0.00% 0 |
| ✓ Une compression du dos de la racine de l'ongle va induire une gouttière unguéale | 1/3 | 100.00% 10 |
| Nombre total de participants: 10 | | |

Q25 Quelles propositions sont vraies concernant les verrues génitales de l'adolescent?

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
50%

Score moyen
3.3/4.0 (83%)


Écart-type
0.95

Difficulté
14/24

| CHOIX DE RÉPONSES | SCORE | RÉPONSES |
|---|-------|------------|
| ✓ Le vaccin à HPV prévient la survenue de condylomes | 1/4 | 50.00% 5 |
| Les préservatifs préviennent parfaitement la prévention de la transmission des PVH des condylomes | 0/4 | 10.00% 1 |
| ✓ Le vaccin à HPV réduit le risque de cancers du col de l'utérus | 1/4 | 100.00% 10 |
| ✓ Devant des condylomes ano-génitaux de l'adolescent se poser la question de rapports sexuels non consentis | 2/4 | 90.00% 9 |
| Nombre total de participants: 10 | | |

Q26 Les condylomes chez l'adolescent sont le plus souvent des auto-contaminations (verrues des mains).

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
70%

Score moyen
0.7/1.0 (70%)

Écart-type
0.48

Difficulté
8/24

| CHOIX DE RÉPONSES | SCORE | RÉPONSES | |
|-------------------|-------|----------|-----------|
| Vrai | 0/1 | 30.00% | 3 |
| ✓ Faux | 1/1 | 70.00% | 7 |
| TOTAL | | | 10 |