


Quizz Nutrition du nourrisson et de l'enfant

Résumé du quiz



Statistiques

Score le plus bas
67%

Médiane
87%

Score le plus élevé
93%

Moyenne: 83%

Écart-type: 10%


Classement des questions

Quizz Nutrition du nourrisson et de l'enfant

QUESTIONS (15)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q12 En raison des teneurs en PCB et en métaux lourds des poissons, leur consommation doit être limitée à 1 fois par semaine chez l'enfant de moins de 1 an	1	45%
Q3 Les différents laits pour prématurés vendus en pharmacie sont tous à peu près équivalents pour les apports caloriques et protéiques	2	55%
Q4 L'amélioration de l'aminogramme des protéines des laits 1er âge n'est qu'un argument marketing.	3	64%
Q10 L'huile de tournesol est aussi intéressante que l'huile de noix ou l'huile de colza	3	64%
Q14 Les apports en lipides des enfants de moins de 3 ans en France sont au dessus de recommandations EFSA.	3	64%
Q8 Si la diversification est commencée avant 4 mois, cela peut augmenter le risque de surpoids ultérieur et d'allergies alimentaires	6	91%
Q9 L'arachide et les fruits à coque ne doivent pas être introduits avant l'âge de 9 mois	6	91%
Q13 Le maintien de 350 ml de lait de croissance jusqu'à 3 ans permet de diminuer les risques de carences martiales.	6	91%
Q15 Parmi les intérêts de la DME (Diversification menée par l'enfant), il a été démontré une limitation des excès de poids par l'auto-régulation alimentaire	6	91%
Q5 Dans le choix d'un lait infantile la teneur en sel est un critère de sélection	10	100%
Q6 Selon la réglementation européenne et française les laits 1er âge et 2e âge doivent être supplémentés en DHA depuis 2020 .	10	100%
Q7 Lors du sevrage d'un allaitement maternel, il est préférable de choisir un lait relais d'allaitement.	10	100%
Q11 Le Gluten ne doit pas être introduit avant 6 mois	10	100%
Q16 La néophobie alimentaire est un trouble de l'oralité nécessitant une prise en charge multidisciplinaire	10	100%
Q17 La quantité de protéines animales cuites donnée par jour est de 10 g par année d'âge	10	100%

Q3 Les différents laits pour prématurés vendus en pharmacie sont tous à peu près équivalents pour les apports caloriques et protéiques

Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
55%

Score moyen
0.5/1.0 (55%)


Écart-type
0.52

Difficulté
2/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	45.45%	5
✓ Faux	1/1	54.55%	6
TOTAL			11

Q4 L'amélioration de l'aminogramme des protéines des laits 1er âge n'est qu'un argument marketing.

Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
64%

Score moyen
0.6/1.0 (64%)


Écart-type
0.50

Difficulté
3/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
vrai	0/1	36.36%	4
✓ Faux	1/1	63.64%	7
TOTAL			11

Q5 Dans le choix d'un lait infantile la teneur en sel est un critère de sélection

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 1



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
91%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
10/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	100.00%	10
Faux	0/1	0.00%	0
TOTAL			10

Q6 Selon la réglementation européenne et française les laits 1er âge et 2e âge doivent être supplémentés en DHA depuis 2020 .

Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
10/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	100.00%	11
Faux	0/1	0.00%	0
TOTAL			11

Q7 Lors du sevrage d'un allaitement maternel, il est préférable de choisir un lait relais d'allaitement.

Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
10/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	0.00%	0
✓ Faux	1/1	100.00%	11
TOTAL			11

Q8 Si la diversification est commencée avant 4 mois, cela peut augmenter le risque de surpoids ultérieur et d'allergies alimentaires

Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
91%

Score moyen
0.9/1.0 (91%)


Écart-type
0.30

Difficulté
6/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	90.91%	10
Faux	0/1	9.09%	1
TOTAL			11

Q9 L'arachide et les fruits à coque ne doivent pas être introduits avant l'âge de 9 mois

Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
91%

Score moyen
0.9/1.0 (91%)


Écart-type
0.30

Difficulté
6/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Vrai	0/1	9.09% 1
✓ Faux	1/1	90.91% 10
TOTAL		11

Q10 L'huile de tournesol est aussi intéressante que l'huile de noix ou l'huile de colza

Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
64%

Score moyen
0.6/1.0 (64%)


Écart-type
0.50

Difficulté
3/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	36.36%	4
✓ Faux	1/1	63.64%	7
TOTAL			11

Q11 Le Gluten ne doit pas être introduit avant 6 mois

Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 100%	Score moyen 1.0/1.0 (100%)	Écart-type 0.00	Difficulté 10/15
---	-------------------------------	--------------------	---------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	0.00%	0
✓ Faux	1/1	100.00%	11
TOTAL			11

Q12 En raison des teneurs en PCB et en métaux lourds des poissons, leur consommation doit être limitée à 1 fois par semaine chez l'enfant de moins de 1 an

Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
45%

Score moyen
0.5/1.0 (45%)


Écart-type
0.52

Difficulté
1/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	54.55%	6
✓ Faux	1/1	45.45%	5
TOTAL			11

Q13 Le maintien de 350 ml de lait de croissance jusqu'à 3 ans permet de diminuer les risques de carences martiales.

Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
91%

Score moyen
0.9/1.0 (91%)


Écart-type
0.30

Difficulté
6/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ Vrai	1/1	90.91% 10
Faux	0/1	9.09% 1
TOTAL		11

Q14 Les apports en lipides des enfants de moins de 3 ans en France sont au dessus de recommandations EFSA.

Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
64%

Score moyen
0.6/1.0 (64%)


Écart-type
0.50

Difficulté
3/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	36.36%	4
✓ Faux	1/1	63.64%	7
TOTAL			11

Q15 Parmi les intérêts de la DME (Diversification menée par l'enfant), il a été démontré une limitation des excès de poids par l'auto-régulation alimentaire

Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
91%

Score moyen
0.9/1.0 (91%)


Écart-type
0.30

Difficulté
6/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	9.09%	1
✓ Faux	1/1	90.91%	10
TOTAL			11

Q16 La néophobie alimentaire est un trouble de l'oralité nécessitant une prise en charge multidisciplinaire

Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
10/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Vrai	0/1	0.00% 0
✓ Faux	1/1	100.00% 11
TOTAL		11

Q17 La quantité de protéines animales cuites donnée par jour est de 10 g par année d'âge

Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)

Écart-type
0.00

Difficulté
10/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	100.00%	11
Faux	0/1	0.00%	0
TOTAL			11