


## Résumé du quiz



### Statistiques

Score le plus bas  
63%

Médiane  
74%

Score le plus élevé  
79%

Moyenne: 72%

Écart-type: 7%

### Classement des questions

## Quizz Les allergies alimentaires de l'enfant

QUESTIONS (18)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q14 La DME et la présence d'un eczéma atopique sur le visage sont-elles compatibles	1	0%
Q17 L'éviction alimentaire est le seul traitement sûr et efficace	2	8%
Q8 Pour traiter un bronchospasme secondaire à une allergie alimentaire j'utilise en premier lieu	3	31%
Q5 Le Trophatop® pédiatrique est un bon examen de dépistage	4	54%
Q9 L'adrénaline n'est pas systématiquement prescrite dans un PAI	5	69%
Q19 Le lait Capricare® peut être une alternative chez un allergique au lait de vache	5	69%
Q10 La gravité de l'allergie alimentaire dépend	7	73%
Q18 La noix de pécan croise avec la noix de Grenoble	8	75%
Q4 L'œsophagite à éosinophile est un diagnostic uniquement clinique	9	85%
Q7 Les prick tests sont réservés aux spécialistes	9	85%
Q13 Les allergologues peuvent explorer les allergies alimentaires quel que soit l'âge de l'enfant	9	85%
Q16 La prévalence de l'allergie alimentaire est en forte augmentation	9	85%
Q20 Un IgE ovomucoïde < 0,1 ku/l autorise l'ingestion d'oeuf cuit	9	85%
Q3 Les vomissements survenus deux heures après le repas ne sont pas de l'allergie alimentaire	14	92%
Q6 Nommer les examens biologiques utiliser pour le diagnostic d'allergie alimentaire	15	100%
Q11 Il faut attendre l'âge de trois ans pour introduire les arachides	15	100%
Q12 La présence d'une urticaire est pathognomonique d'une réaction allergique	15	100%
Q15 Le PAI est un document d'expert, et ne peut être rédigé par un pédiatre généraliste	15	100%

## Q1 Prénom


Réponses obtenues : 13    Question(s) ignorée(s) : 0

## Q2 Nom

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0

### Q3 Les vomissements survenus deux heures après le repas ne sont pas de l'allergie alimentaire

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



#### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
92%

Score moyen  
0.9/1.0 (92%)


Écart-type  
0.28

Difficulté  
14/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	7.69%	1
✓ Faux	1/1	92.31%	12
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>

## Q4 L'œsophagite à éosinophile est un diagnostic uniquement clinique

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
85%

Score moyen  
0.8/1.0 (85%)


Écart-type  
0.38

Difficulté  
9/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	15.38%	2
✓ Faux	1/1	84.62%	11
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>

## Q5 Le Trophatop® pédiatrique est un bon examen de dépistage

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
54%

Score moyen  
0.5/1.0 (54%)


Écart-type  
0.52

Difficulté  
4/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	46.15%	6
✓ Faux	1/1	53.85%	7
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>

## Q6 Nommer les examens biologiques utiliser pour le diagnostic d'allergie alimentaire

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
100%

Score moyen  
1.0/1.0 (100%)


Écart-type  
0.00

Difficulté  
15/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
NFSp	0/1	23.08% 3
✓ IgE spécifique unitaire	1/1	100.00% 13
IgE totales	0/1	30.77% 4
Phadiatop®	0/1	23.08% 3
Trophatop®	0/1	69.23% 9
<b>Nombre total de participants: 13</b>		

## Q7 Les prick tests sont réservés aux spécialistes

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
85%

Score moyen  
0.8/1.0 (85%)


Écart-type  
0.38

Difficulté  
9/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	15.38%	2
✓ Faux	1/1	84.62%	11
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>

## Q8 Pour traiter un bronchospasme secondaire à une allergie alimentaire j'utilise en premier lieu

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
31%

Score moyen  
0.3/1.0 (31%)


Écart-type  
0.48

Difficulté  
3/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
une corticothérapie orale	0/1	15.38%	2
des BDCA	0/1	76.92%	10
✓ de l'adrénaline IM	1/1	30.77%	4
un antihistaminique	0/1	0.00%	0
Cela est dû à sa latéralité à gauche	0/1	0.00%	0
<b>Nombre total de participants: 13</b>			

## Q9 L'adrénaline n'est pas systématiquement prescrite dans un PAI

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
69%

Score moyen  
0.7/1.0 (69%)


Écart-type  
0.48

Difficulté  
5/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	69.23%	9
Faux	0/1	30.77%	4
Cela rassure sur la bonne intelligence	0/1	0.00%	0
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>

## Q10 La gravité de l'allergie alimentaire dépend

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
46%

Score moyen  
1.5/2.0 (73%)


Écart-type  
0.52

Difficulté  
7/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ de l'allergène	1/2	84.62%	11
✓ de l'âge de survenue	1/2	61.54%	8
du sexe de l'enfant	0/2	0.00%	0
de la prématurité	0/2	0.00%	0
de l'eczéma atopique associé	0/2	15.38%	2
<b>Nombre total de participants: 13</b>			

## Q11 Il faut attendre l'âge de trois ans pour introduire les arachides

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0




### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 100%	Score moyen 1.0/1.0 (100%)	Écart-type 0.00	Difficulté 15/18
---	-------------------------------	--------------------	---------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	0.00%	0
✓ Faux	1/1	100.00%	13
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>

## Q12 La présence d'une urticaire est pathognomonique d'une réaction allergique

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
100%

Score moyen  
1.0/1.0 (100%)


Écart-type  
0.00

Difficulté  
15/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	0.00%	0
✓ Faux	1/1	100.00%	13
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>

## Q13 Les allergologues peuvent explorer les allergies alimentaires quel que soit l'âge de l'enfant

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
85%

Score moyen  
0.8/1.0 (85%)


Écart-type  
0.38

Difficulté  
9/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	84.62%	11
Faux	0/1	15.38%	2
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>

## Q14 La DME et la présence d'un eczéma atopique sur le visage sont-elles compatibles

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
0%

Score moyen  
0.0/1.0 (0%)


Écart-type  
0.00

Difficulté  
1/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	100.00%	13
✓ Faux	1/1	0.00%	0
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>

## Q15 Le PAI est un document d'expert, et ne peut être rédigé par un pédiatre généraliste

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
100%

Score moyen  
1.0/1.0 (100%)


Écart-type  
0.00

Difficulté  
15/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	0.00%	0
✓ Faux	1/1	100.00%	13
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>

## Q16 La prévalence de l'allergie alimentaire est en forte augmentation

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
85%

Score moyen  
0.8/1.0 (85%)


Écart-type  
0.38

Difficulté  
9/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	84.62%	11
Faux	0/1	15.38%	2
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>

## Q17 L'éviction alimentaire est le seul traitement sûr et efficace

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
8%

Score moyen  
0.1/1.0 (8%)


Écart-type  
0.28

Difficulté  
2/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	92.31%	12
✓ Faux	1/1	7.69%	1
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>

## Q18 La noix de pécan croise avec la noix de Grenoble

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 1



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
69%

Score moyen  
0.8/1.0 (75%)


Écart-type  
0.45

Difficulté  
8/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	75.00%	9
Faux	0/1	25.00%	3
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>

## Q19 Le lait Capricare® peut être une alternative chez un allergique au lait de vache

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
69%

Score moyen  
0.7/1.0 (69%)


Écart-type  
0.48

Difficulté  
5/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	30.77%	4
✓ Faux	1/1	69.23%	9
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>

## Q20 Un IgE ovomucoïde < 0,1 ku/l autorise l'ingestion d'oeuf cuit

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
85%

Score moyen  
0.8/1.0 (85%)

Écart-type  
0.38

Difficulté  
9/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	84.62%	11
Faux	0/1	15.38%	2
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>