


## Quizz Nutrition du nourrisson et de l'enfant

### Résumé du quiz



#### Statistiques

Score le plus bas  
33%

Médiane  
70%

Score le plus élevé  
93%

Moyenne: 69%

Écart-type: 16%


#### Classement des questions

## Quizz Nutrition du nourrisson et de l'enfant

QUESTIONS (15)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
<b>Q3</b> Les différents laits pour prématurés vendus en pharmacie sont tous à peu près équivalents pour les apports caloriques et protéiques	1	42%
<b>Q10</b> L'huile de tournesol est aussi intéressante que l'huile de noix ou l'huile de colza	1	42%
<b>Q14</b> Les apports en lipides des enfants de moins de 3 ans en France sont au dessus de recommandations EFSA.	1	42%
<b>Q12</b> En raison des teneurs en PCB et en métaux lourds des poissons, leur consommation doit être limitée à 1 fois par semaine chez l'enfant de moins de 1 an	4	50%
<b>Q4</b> L'amélioration de l'aminogramme des protéines des laits 1er âge n'est qu'un argument marketing.	5	58%
<b>Q8</b> Si la diversification est commencée avant 4 mois, cela peut augmenter le risque de surpoids ultérieur et d'allergies alimentaires	5	58%
<b>Q15</b> Parmi les intérêts de la DME (Diversification menée par l'enfant), il a été démontré une limitation des excès de poids par l'auto-régulation alimentaire	5	58%
<b>Q16</b> La néophobie alimentaire est un trouble de l'oralité nécessitant une prise en charge multidisciplinaire	8	67%
<b>Q7</b> Lors du sevrage d'un allaitement maternel, il est préférable de choisir un lait relais d'allaitement.	9	75%
<b>Q5</b> Dans le choix d'un lait infantile la teneur en sel est un critère de sélection	10	83%
<b>Q9</b> L'arachide et les fruits à coque ne doivent pas être introduits avant l'âge de 9 mois	10	83%
<b>Q13</b> Le maintien de 350 ml de lait de croissance jusqu'à 3 ans permet de diminuer les risques de carences martiales.	10	83%
<b>Q11</b> Le Gluten ne doit pas être introduit avant 6 mois	13	92%
<b>Q6</b> Selon la réglementation européenne et française les laits 1er âge et 2e âge doivent être supplémentés en DHA depuis 2020 .	14	100%
<b>Q17</b> La quantité de protéines animales cuites donnée par jour est de 10 g par année d'âge	14	100%

### Q3 Les différents laits pour prématurés vendus en pharmacie sont tous à peu près équivalents pour les apports caloriques et protéiques

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



#### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
42%

Score moyen  
0,4/1,0 (42%)


Écart-type  
0,51

Difficulté  
1/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	58.33%	7
✓ Faux	1/1	41.67%	5
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>

## Q4 L'amélioration de l'aminogramme des protéines des laits 1er âge n'est qu'un argument marketing.

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
58%

Score moyen  
0.6/1.0 (58%)


Écart-type  
0.51

Difficulté  
5/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
vrai	0/1	41.67%	5
✓ Faux	1/1	58.33%	7
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>

## Q5 Dans le choix d'un lait infantile la teneur en sel est un critère de sélection

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
83%

Score moyen  
0.8/1.0 (83%)

Écart-type  
0.39

Difficulté  
10/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	83.33%	10
Faux	0/1	16.67%	2
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>

## Q6 Selon la réglementation européenne et française les laits 1er âge et 2e âge doivent être supplémentés en DHA depuis 2020 .

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
100%

Score moyen  
1.0/1.0 (100%)


Écart-type  
0.00

Difficulté  
14/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	100.00%	12
Faux	0/1	0.00%	0
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>

### Q7 Lors du sevrage d'un allaitement maternel, il est préférable de choisir un lait relais d'allaitement.

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



#### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
75%

Score moyen  
0.8/1.0 (75%)


Écart-type  
0.45

Difficulté  
9/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	25.00%	3
✓ Faux	1/1	75.00%	9
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>

## Q8 Si la diversification est commencée avant 4 mois, cela peut augmenter le risque de surpoids ultérieur et d'allergies alimentaires

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
58%

Score moyen  
0.6/1.0 (58%)


Écart-type  
0.51

Difficulté  
5/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	58.33%	7
Faux	0/1	41.67%	5
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>

## Q9 L'arachide et les fruits à coque ne doivent pas être introduits avant l'âge de 9 mois

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
83%

Score moyen  
0.8/1.0 (83%)


Écart-type  
0.39

Difficulté  
10/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	16.67%	2
✓ Faux	1/1	83.33%	10
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>

## Q10 L'huile de tournesol est aussi intéressante que l'huile de noix ou l'huile de colza

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
42%

Score moyen  
0,4/1,0 (42%)


Écart-type  
0,51

Difficulté  
1/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	58.33%	7
✓ Faux	1/1	41.67%	5
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>

## Q11 Le Gluten ne doit pas être introduit avant 6 mois

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
92%

Score moyen  
0.9/1.0 (92%)


Écart-type  
0.29

Difficulté  
13/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	8.33%	1
✓ Faux	1/1	91.67%	11
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>

## Q12 En raison des teneurs en PCB et en métaux lourds des poissons, leur consommation doit être limitée à 1 fois par semaine chez l'enfant de moins de 1 an

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
50%

Score moyen  
0.5/1.0 (50%)


Écart-type  
0.52

Difficulté  
4/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	50.00%	6
✓ Faux	1/1	50.00%	6
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>

### Q13 Le maintien de 350 ml de lait de croissance jusqu'à 3 ans permet de diminuer les risques de carences martiales.

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



#### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
83%

Score moyen  
0.8/1.0 (83%)


Écart-type  
0.39

Difficulté  
10/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	83.33%	10
Faux	0/1	16.67%	2
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>

## Q14 Les apports en lipides des enfants de moins de 3 ans en France sont au dessus de recommandations EFSA.

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
42%

Score moyen  
0,4/1,0 (42%)


Écart-type  
0,51

Difficulté  
1/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	58.33%	7
✓ Faux	1/1	41.67%	5
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>

### Q15 Parmi les intérêts de la DME (Diversification menée par l'enfant), il a été démontré une limitation des excès de poids par l'auto-régulation alimentaire

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



#### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
58%

Score moyen  
0.6/1.0 (58%)


Écart-type  
0.51

Difficulté  
5/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	41.67%	5
✓ Faux	1/1	58.33%	7
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>

## Q16 La néophobie alimentaire est un trouble de l'oralité nécessitant une prise en charge multidisciplinaire

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
67%

Score moyen  
0.7/1.0 (67%)


Écart-type  
0.49

Difficulté  
8/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	33.33%	4
✓ Faux	1/1	66.67%	8
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>

## Q17 La quantité de protéines animales cuites donnée par jour est de 10 g par année d'âge

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
100%

Score moyen  
1.0/1.0 (100%)

Écart-type  
0.00

Difficulté  
14/15

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	100.00%	12
Faux	0/1	0.00%	0
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>