


## Quizz Les allergies alimentaires de l'enfant

### Résumé du quiz

Score moyen  
87% • 16.6/19 PTS



#### Statistiques

Score le plus bas  
74%

Médiane  
84%

Score le plus élevé  
95%

Moyenne: 87%

Écart-type: 7%


#### Classement des questions

## Quizz Les allergies alimentaires de l'enfant

QUESTIONS (18)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q14 La DME et la présence d'un eczéma atopique sur le visage sont-elles compatibles	1	31%
Q17 L'éviction alimentaire est le seul traitement sûr et efficace	2	46%
Q8 Pour traiter un bronchospasme secondaire à une allergie alimentaire j'utilise en premier lieu	3	77%
Q10 La gravité de l'allergie alimentaire dépend	3	77%
Q4 L'œsophagite à éosinophile est un diagnostic uniquement clinique	5	85%
Q11 Il faut attendre l'âge de trois ans pour introduire les arachides	5	85%
Q3 Les vomissements survenus deux heures après le repas ne sont pas de l'allergie alimentaire	7	92%
Q12 La présence d'une urticaire est pathognomonique d'une réaction allergique	7	92%
Q5 Le Trophatop® pédiatrique est un bon examen de dépistage	9	100%
Q6 Nommer les examens biologiques utiliser pour le diagnostic d'allergie alimentaire	9	100%
Q7 Les prick tests sont réservés aux spécialistes	9	100%
Q9 L'adrénaline n'est pas systématiquement prescrite dans un PAI	9	100%
Q13 Les allergologues peuvent explorer les allergies alimentaires quel que soit l'âge de l'enfant	9	100%
Q15 Le PAI est un document d'expert, et ne peut être rédigé par un pédiatre généraliste	9	100%
Q16 La prévalence de l'allergie alimentaire est en forte augmentation	9	100%
Q18 La noix de pécan croise avec la noix de Grenoble	9	100%
Q19 Le lait Capricare® peut être une alternative chez un allergique au lait de vache	9	100%
Q20 Un IgE ovomucoïde < 0,1 ku/l autorise l'ingestion d'oeuf cuit	9	100%

### Q3 Les vomissements survenus deux heures après le repas ne sont pas de l'allergie alimentaire

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



#### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
92%

Score moyen  
0.9/1.0 (92%)


Écart-type  
0.28

Difficulté  
7/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Vrai	0/1	7.69% 1
✓ Faux	1/1	92.31% 12
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>

## Q4 L'œsophagite à éosinophile est un diagnostic uniquement clinique

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
85%

Score moyen  
0.8/1.0 (85%)


Écart-type  
0.38

Difficulté  
5/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	15.38%	2
✓ Faux	1/1	84.62%	11
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>

## Q5 Le Trophatop® pédiatrique est un bon examen de dépistage

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0




### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 100%	Score moyen 1.0/1.0 (100%)	Écart-type 0.00	Difficulté 9/18
---	-------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	0.00%	0
✓ Faux	1/1	100.00%	13
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>

## Q6 Nommer les examens biologiques utiliser pour le diagnostic d'allergie alimentaire

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
100%

Score moyen  
1.0/1.0 (100%)


Écart-type  
0.00

Difficulté  
9/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
NFSp	0/1	15.38%	2
✓ IgE spécifique unitaire	1/1	100.00%	13
IgE totales	0/1	0.00%	0
Phadiatop®	0/1	0.00%	0
Trophatop®	0/1	0.00%	0
<b>Nombre total de participants: 13</b>			

## Q7 Les prick tests sont réservés aux spécialistes

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
100%

Score moyen  
1.0/1.0 (100%)


Écart-type  
0.00

Difficulté  
9/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	0.00%	0
✓ Faux	1/1	100.00%	13
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>

## Q8 Pour traiter un bronchospasme secondaire à une allergie alimentaire j'utilise en premier lieu

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
77%

Score moyen  
0.8/1.0 (77%)


Écart-type  
0.44

Difficulté  
3/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
une corticothérapie orale	0/1	0.00% 0
des BDCA	0/1	23.08% 3
✓ de l'adrénaline IM	1/1	76.92% 10
un antihistaminique	0/1	0.00% 0
Cela est dû à sa latéralité à gauche	0/1	0.00% 0
<b>Nombre total de participants: 13</b>		

## Q9 L'adrénaline n'est pas systématiquement prescrite dans un PAI

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
100%

Score moyen  
1.0/1.0 (100%)


Écart-type  
0.00

Difficulté  
9/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	100.00%	13
Faux	0/1	0.00%	0
Cela rassure sur la bonne intelligence	0/1	0.00%	0
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>

## Q10 La gravité de l'allergie alimentaire dépend

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
54%

Score moyen  
1.5/2.0 (77%)


Écart-type  
0.52

Difficulté  
3/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ de l'allergène	1/2	69.23%	9
✓ de l'âge de survenue	1/2	84.62%	11
du sexe de l'enfant	0/2	0.00%	0
de la prématurité	0/2	0.00%	0
de l'eczéma atopique associé	0/2	38.46%	5
<b>Nombre total de participants: 13</b>			

## Q11 Il faut attendre l'âge de trois ans pour introduire les arachides

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
85%

Score moyen  
0.8/1.0 (85%)


Écart-type  
0.38

Difficulté  
5/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	15.38%	2
✓ Faux	1/1	84.62%	11
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>

## Q12 La présence d'une urticaire est pathognomonique d'une réaction allergique

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
92%

Score moyen  
0.9/1.0 (92%)


Écart-type  
0.28

Difficulté  
7/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Vrai	0/1	7.69% 1
✓ Faux	1/1	92.31% 12
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>

### Q13 Les allergologues peuvent explorer les allergies alimentaires quel que soit l'âge de l'enfant

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



#### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
100%

Score moyen  
1.0/1.0 (100%)


Écart-type  
0.00

Difficulté  
9/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	100.00%	13
Faux	0/1	0.00%	0
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>

## Q14 La DME et la présence d'un eczéma atopique sur le visage sont-elles compatibles

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
31%

Score moyen  
0.3/1.0 (31%)


Écart-type  
0.48

Difficulté  
1/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	69.23%	9
✓ Faux	1/1	30.77%	4
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>

## Q15 Le PAI est un document d'expert, et ne peut être rédigé par un pédiatre généraliste

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
100%

Score moyen  
1.0/1.0 (100%)


Écart-type  
0.00

Difficulté  
9/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	0.00%	0
✓ Faux	1/1	100.00%	13
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>

## Q16 La prévalence de l'allergie alimentaire est en forte augmentation

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0




### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 100%	Score moyen 1.0/1.0 (100%)	Écart-type 0.00	Difficulté 9/18
---	-------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	100.00%	13
Faux	0/1	0.00%	0
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>

## Q17 L'éviction alimentaire est le seul traitement sûr et efficace

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
46%

Score moyen  
0.5/1.0 (46%)


Écart-type  
0.52

Difficulté  
2/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	53.85%	7
✓ Faux	1/1	46.15%	6
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>

## Q18 La noix de pécan croise avec la noix de Grenoble

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
100%

Score moyen  
1.0/1.0 (100%)


Écart-type  
0.00

Difficulté  
9/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	100.00%	13
Faux	0/1	0.00%	0
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>

## Q19 Le lait Capricare® peut être une alternative chez un allergique au lait de vache

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
100%

Score moyen  
1.0/1.0 (100%)


Écart-type  
0.00

Difficulté  
9/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Vrai	0/1	0.00% 0
✓ Faux	1/1	100.00% 13
<b>TOTAL</b>		<b>13</b>

## Q20 Un IgE ovomucoïde < 0,1 ku/l autorise l'ingestion d'oeuf cuit

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 100%	Score moyen 1.0/1.0 (100%)	Écart-type 0.00	Difficulté 9/18
---	-------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	100.00%	13
Faux	0/1	0.00%	0
<b>TOTAL</b>			<b>13</b>