

Rapport global STEP

Informations générales du test

Parcours : Enfant hypotrophe

Session : 2

Formateur : Dr BAUDOIN


Nombre de stagiaires : 20

% de bonnes réponses avant : 74.29 %

% de bonnes réponses après : 79.29 %


Q 1: 1. Peut-on consulter une orthophoniste avant un an ?

Réponse(s) attendue(s) : 1. 1. Peut-on consulter une orthophoniste avant un an ? = Oui




Q 2: 2. Devant un enfant qui refuse des morceaux à 18 mois doit-on s'inquiéter ?

Réponse(s) attendue(s) : 1. 2. Devant un enfant qui refuse des morceaux à 18 mois doit-on s'inquiéter ? = Oui




Q 3: 3. Peut-on diagnostiquer un trouble de l'oralité chez un enfant allaité?

Réponse(s) attendue(s) : 1. 3. Peut - on diagnostiquer un trouble de l'oralité chez un enfant allaité ? = Oui




Q 4: 4. Un enfant peut -il ne pas manger pendant plusieurs jours même en l'absence de pathologie organique ?

Réponse(s) attendue(s) : 1. 4. Un enfant peut -il ne pas manger pendant plusieurs jours même en l'absence de pathologie organique ? = Oui




Q 5: 5. Faut-il arrêter les morceaux chez les enfants qui ont des hauts le coeur avec les purées en morceaux ?

Réponse(s) attendue(s) : 1. 5. Faut-il arrêter les morceaux chez les enfants qui ont des hauts le coeur avec les purées en morceaux ? = Non



Q 6: 6. Les troubles alimentaires chez l'enfant ont le plus souvent une cause isolée ?

Réponse(s) attendue(s) : 1. 6. Les troubles alimentaires chez l'enfant ont le plus souvent une cause isolée ? = Non



Q 7: 7. Faut-il couper le frein de langue chez les bébés ayant des difficultés alimentaires ?

Réponse(s) attendue(s): 1. 7. Faut-il couper le frein de langue chez les bébés ayant des difficultés alimentaires ? = Non

