


Résumé du quiz

Score moyen

94% • 13.1/14 PTS



Statistiques

Score le plus bas	Médiane	Score le plus élevé
79%	100%	100%

Moyenne: 94%


Écart-type: 8%

Classement des questions

QUESTIONS (10)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q7 Il est exceptionnel qu'un enfant hyperactif soit calme dans le cabinet du médecin	1	60%
Q4 Un enfant TDAH peut très bien être hyperactif seulement à l'école ou seulement à la maison	2	80%
Q2 les symptômes du TDAH commencent avant 12 ans	3	93%
Q3 Devant un enfant TDAH, il faut toujours s'assurer qu'il a des apprentissages normaux	4	93%
Q5 Il existe des formes de TDAH sans hyperactivité	4	93%
Q1 Il est indispensable de pratiquer un bilan neuropsychologique pour faire le diagnostic de TDAH	6	100%
Q6 Les troubles du spectre autistique sont souvent associés avec le TDAH	6	100%
Q8 Quel bilan paraclinique faut-il faire systématiquement avant la mise sous méthylphénidate (QCM plusieurs réponses justes possibles)	6	100%
Q9 Quels sont les effets secondaires possibles du traitement par méthylphénidate	6	100%
Q10 Quelles sont les prises en charge validées du TDAH	6	100%

Q1 Il est indispensable de pratiquer un bilan neuropsychologique pour faire le diagnostic de TDAH

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
6/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
OUI	0/1	0.00% 0
✓ NON	1/1	100.00% 15
je ne sais pas	0/1	0.00% 0
Nombre total de participants: 15		

Q2 les symptômes du TDAH commencent avant 12 ans

Réponses obtenues : 14 Question(s) ignorée(s) : 1



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
87%

Score moyen
0.9/1.0 (93%)


Écart-type
0.27

Difficulté
3/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ OUI	1/1	92.86%	13
NON	0/1	7.14%	1
je ne sais pas	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 14			

Q3 Devant un enfant TDAH, il faut toujours s'assurer qu'il a des apprentissages normaux

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
93%

Score moyen
0.9/1.0 (93%)


Écart-type
0.26

Difficulté
4/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ OUI	1/1	93.33%	14
NON	0/1	6.67%	1
je ne sais pas	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 15			

Q4 Un enfant TDAH peut très bien être hyperactif seulement à l'école ou seulement à la maison

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
80%

Score moyen
0.8/1.0 (80%)


Écart-type
0.41

Difficulté
2/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
oui	0/1	20.00%	3
✓ non	1/1	80.00%	12
je ne sais pas	0/1	0.00%	0
TOTAL			15

Q5 Il existe des formes de TDAH sans hyperactivité

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
93%

Score moyen
0.9/1.0 (93%)


Écart-type
0.26

Difficulté
4/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ OUI	1/1	93.33%	14
NON	0/1	6.67%	1
je ne sais pas	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 15			

Q6 Les troubles du spectre autistique sont souvent associés avec le TDAH

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
6/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ OUI	1/1	100.00%	15
NON	0/1	0.00%	0
je ne sais pas	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 15			

Q7 Il est exceptionnel qu'un enfant hyperactif soit calme dans le cabinet du médecin

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
60%

Score moyen
0.6/1.0 (60%)


Écart-type
0.51

Difficulté
1/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
OUI	0/1	33.33%	5
✓ NON	1/1	60.00%	9
je ne sais pas	0/1	6.67%	1
Nombre total de participants: 15			

Q8 Quel bilan paraclinique faut-il faire systématiquement avant la mise sous méthylphénidate (QCM plusieurs réponses justes possibles)

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
6/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Aucun des éléments ci-dessus	1/1	100.00%	15
dosage de fer sanguin avec ferritinémie	0/1	0.00%	0
NFP	0/1	0.00%	0
créatininémie	0/1	0.00%	0
EEG	0/1	0.00%	0
ECG	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 15			

Q9 Quels sont les effets secondaires possibles du traitement par méthylphénidate

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
4.0/4.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
6/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Aucun des éléments ci-dessus	0/4	0.00%	0
✓ l'anorexie	1/4	100.00%	15
la toxicomanie à l'âge adulte	0/4	6.67%	1
✓ les tics	1/4	100.00%	15
✓ des douleurs abdominales en début de traitement	1/4	100.00%	15
✓ des difficultés d'endormissement	1/4	100.00%	15
Nombre total de participants: 15			

Q10 Quelles sont les prises en charge validées du TDAH

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
2.0/2.0 (100%)

Écart-type
0.00

Difficulté
6/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
le neurofeed-back	0/2	0.00% 0
la remédiation neuropsychologique	0/2	66.67% 10
✓ le traitement par méthylphénidate	1/2	100.00% 15
✓ les groupes parentaux type groupes Barkley	1/2	100.00% 15
Nombre total de participants: 15		