


Résumé du quiz

Score moyen

76% • 10.7/14 PTS



Statistiques

Score le plus bas	Médiane	Score le plus élevé
29%	79%	100%

Moyenne: 76%


Écart-type: 17%

Classement des questions

QUESTIONS (10)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q8 Quel bilan paraclinique faut-il faire systématiquement avant la mise sous méthylphénidate (QCM plusieurs réponses justes possibles)	1	40%
Q7 Il est exceptionnel qu'un enfant hyperactif soit calme dans le cabinet du médecin	2	53%
Q1 Il est indispensable de pratiquer un bilan neuropsychologique pour faire le diagnostic de TDAH	3	67%
Q3 Devant un enfant TDAH, il faut toujours s'assurer qu'il a des apprentissages normaux	4	73%
Q4 Un enfant TDAH peut très bien être hyperactif seulement à l'école ou seulement à la maison	4	73%
Q6 Les troubles du spectre autistique sont souvent associés avec le TDAH	4	73%
Q9 Quels sont les effets secondaires possibles du traitement par méthylphénidate	7	77%
Q5 Il existe des formes de TDAH sans hyperactivité	8	93%
Q10 Quelles sont les prises en charge validées du TDAH	8	93%
Q2 les symptômes du TDAH commencent avant 12 ans	10	100%

Q1 Il est indispensable de pratiquer un bilan neuropsychologique pour faire le diagnostic de TDAH

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
67%

Score moyen
0.7/1.0 (67%)


Écart-type
0.49

Difficulté
3/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
OUI	0/1	33.33%	5
✓ NON	1/1	66.67%	10
je ne sais pas	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 15			

Q2 les symptômes du TDAH commencent avant 12 ans

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
10/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ OUI	1/1	100.00%	15
NON	0/1	0.00%	0
je ne sais pas	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 15			

Q3 Devant un enfant TDAH, il faut toujours s'assurer qu'il a des apprentissages normaux

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
73%

Score moyen
0.7/1.0 (73%)


Écart-type
0.46

Difficulté
4/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ OUI	1/1	73.33% 11
NON	0/1	20.00% 3
je ne sais pas	0/1	6.67% 1
Nombre total de participants: 15		

Q4 Un enfant TDAH peut très bien être hyperactif seulement à l'école ou seulement à la maison

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
73%

Score moyen
0.7/1.0 (73%)


Écart-type
0.46

Difficulté
4/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
oui	0/1	20.00%	3
✓ non	1/1	73.33%	11
je ne sais pas	0/1	6.67%	1
TOTAL			15

Q5 Il existe des formes de TDAH sans hyperactivité

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
93%

Score moyen
0.9/1.0 (93%)


Écart-type
0.26

Difficulté
8/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ OUI	1/1	93.33%	14
NON	0/1	0.00%	0
je ne sais pas	0/1	6.67%	1
Nombre total de participants: 15			

Q6 Les troubles du spectre autistique sont souvent associés avec le TDAH

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
73%

Score moyen
0.7/1.0 (73%)


Écart-type
0.46

Difficulté
4/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ OUI	1/1	73.33%	11
NON	0/1	20.00%	3
je ne sais pas	0/1	6.67%	1
Nombre total de participants: 15			

Q7 Il est exceptionnel qu'un enfant hyperactif soit calme dans le cabinet du médecin

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
53%

Score moyen
0.5/1.0 (53%)


Écart-type
0.52

Difficulté
2/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
OUI	0/1	40.00%	6
✓ NON	1/1	53.33%	8
je ne sais pas	0/1	6.67%	1
Nombre total de participants: 15			

Q8 Quel bilan paraclinique faut-il faire systématiquement avant la mise sous méthylphénidate (QCM plusieurs réponses justes possibles)

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
40%

Score moyen
0.4/1.0 (40%)


Écart-type
0.51

Difficulté
1/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Aucun des éléments ci-dessus	1/1	40.00%	6
dosage de fer sanguin avec ferritinémie	0/1	13.33%	2
NFP	0/1	6.67%	1
créatininémie	0/1	6.67%	1
EEG	0/1	0.00%	0
ECG	0/1	53.33%	8
Nombre total de participants: 15			

Q9 Quels sont les effets secondaires possibles du traitement par méthylphénidate

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
33%

Score moyen
3.1/4.0 (77%)


Écart-type
0.88

Difficulté
7/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Aucun des éléments ci-dessus	0/4	0.00% 0
✓ l'anorexie	1/4	93.33% 14
la toxicomanie à l'âge adulte	0/4	13.33% 2
✓ les tics	1/4	66.67% 10
✓ des douleurs abdominales en début de traitement	1/4	73.33% 11
✓ des difficultés d'endormissement	1/4	73.33% 11
Nombre total de participants: 15		

Q10 Quelles sont les prises en charge validées du TDAH

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
87%

Score moyen
1.9/2.0 (93%)

Écart-type
0.35

Difficulté
8/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
le neurofeed-back	0/2	20.00% 3
la remédiation neuropsychologique	0/2	66.67% 10
✓ le traitement par méthylphénidate	1/2	100.00% 15
✓ les groupes parentaux type groupes Barkley	1/2	86.67% 13
Nombre total de participants: 15		