


## Quizz Pré Post test Méthylphénidate 2024

### Résumé du quiz



#### Statistiques

Score le plus bas  
43%

Médiane  
64%

Score le plus élevé  
100%

Moyenne: 70%


Écart-type: 17%

#### Classement des questions

QUESTIONS (5)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q6 Le médecin qui rédige la prescription mensuelle de méthylphénidate, après la prescription initiale	1	60%
Q7 Le médecin traitant	2	62%
Q3 A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de méthylphénidate nécessite	3	73%
Q5 La prescription du Méthylphénidate	4	82%
Q4 Chez un enfant ou un adolescent traité par Méthylphénidate	5	87%

## Q3 A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de méthylphénidate nécessite

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
40%

Score moyen  
2.2/3.0 (73%)


Écart-type  
0.77

Difficulté  
3/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Un contrôle régulier des fonctions hépatiques et rénales.	0/3	0.00% 0
✓ Un avis cardiologique préalable en cas d'antécédents de trouble du rythme ou de la conduction cardiaque	1/3	80.00% 12
Un arrêt du traitement en cas d'anorexie même limitée au repas du midi	0/3	6.67% 1
✓ D'adapter la posologie en fonction de l'efficacité et de la tolérance	1/3	93.33% 14
✓ De ne pas dépasser la posologie de 2 mg/kg/jour	1/3	46.67% 7
<b>Nombre total de participants: 15</b>		

## Q4 Chez un enfant ou un adolescent traité par Méthylphénidate

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
87%

Score moyen  
0.9/1.0 (87%)

Écart-type  
0.35

Difficulté  
5/5


### CHOIX DE RÉPONSES

	SCORE	RÉPONSES
La survenue d'un trouble d'endormissement est rare et justifie l'arrêt du traitement	0/1	13.33% 2
La survenue de céphalées en fin de journée impose l'arrêt du traitement pour une réévaluation plus complète de la situation	0/1	40.00% 6
La perte d'appétit quand elle est liée au traitement survient sur les quatre repas de la journée	0/1	13.33% 2
✓ Les difficultés d'endormissement sont fréquentes et peuvent être améliorées par une supplémentation par Mélatonine	1/1	86.67% 13
La supplémentation par Mélatonine exige en cas de trouble d'endormissement de recourir à la prescription d'une forme à libération retardée	0/1	40.00% 6

Nombre total de participants: 15

## Q5 La prescription du Méthylphénidate

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
53%

Score moyen  
2.5/3.0 (82%)


Écart-type  
0.64

Difficulté  
4/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Se fait pour une durée de 28 jours, avec renouvellement autorisé jusqu'à deux fois.	0/3	26.67% 4
✓ Se fait sur ordonnance sécurisée	1/3	100.00% 15
✓ Nécessite d'inscrire le nom de la pharmacie sur l'ordonnance	1/3	80.00% 12
Peut se faire pour une durée de trois mois, éventuellement renouvelable une fois	0/3	6.67% 1
✓ Nécessite d'inscrire sur l'ordonnance le nombre de lignes de prescription	1/3	66.67% 10
<b>Nombre total de participants: 15</b>		

## Q6 Le médecin qui rédige la prescription mensuelle de méthylphénidate, après la prescription initiale

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
33%

Score moyen  
1.8/3.0 (60%)


Écart-type  
1.15

Difficulté  
1/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ Peut modifier la présentation galénique	1/3	46.67% 7
Doit respecter strictement le détail et le libellé de la primo prescription hospitalière	0/3	26.67% 4
✓ Peut modifier la dose prescrite	1/3	73.33% 11
Doit arrêter le traitement pour les vacances scolaires	0/3	13.33% 2
✓ Peut rédiger une ordonnance avant 28 jours en mentionnant «chevauchement autorisé».	1/3	60.00% 9
<b>Nombre total de participants: 15</b>		

## Q7 Le médecin traitant

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
20%

Score moyen  
2.5/4.0 (62%)

Écart-type  
1.13

Difficulté  
2/5

### CHOIX DE RÉPONSES

	SCORE	RÉPONSES
✓ Ne doit pas dépasser une dose de 60 mg sans en informer le médecin primo-prescripteur	1/4	66.67% 10
✓ En cas d'effet secondaire, peut passer d'une forme commerciale à l'autre (exemple du Concerta® au Quasym®) car les effets secondaires ne sont pas toujours les mêmes	1/4	80.00% 12
✓ Peut augmenter la dose sans en informer le médecin spécialiste primo-prescripteur.	1/4	40.00% 6
Doit baisser la dose en cas d'anorexie	0/4	53.33% 8
✓ Peut passer à une forme non-retard en cas d'effet secondaire en fin de journée (trouble d'endormissement par exemple).	1/4	60.00% 9

Nombre total de participants: 15