


Résumé du quiz

Score moyen
77% • 10.8/14 PTS



Statistiques

Score le plus bas	Médiane	Score le plus élevé
57%	86%	93%

Moyenne: 77%

Écart-type: 13%

Classement des questions

QUESTIONS (5)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q3 A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de méthylphénidate nécessite	1	60%
Q7 Le médecin traitant	2	62%
Q6 Le médecin qui rédige la prescription mensuelle de méthylphénidate, après la prescription initiale	3	89%
Q5 La prescription du Méthylphénidate	4	96%
Q4 Chez un enfant ou un adolescent traité par Méthylphénidate	5	100%

Q1 Prénom


Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0

Q2 Nom

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0

Q3 A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de méthylphénidate nécessite

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
13%

Score moyen
1.8/3.0 (60%)

Écart-type
0.68

Difficulté
1/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Un contrôle régulier des fonctions hépatiques et rénales.	0/3	0.00% 0
✓ Un avis cardiologique préalable en cas d'antécédents de trouble du rythme ou de la conduction cardiaque	1/3	60.00% 9
Un arrêt du traitement en cas d'anorexie même limitée au repas du midi	0/3	0.00% 0
✓ D'adapter la posologie en fonction de l'efficacité et de la tolérance	1/3	100.00% 15
✓ De ne pas dépasser la posologie de 2 mg/kg/jour	1/3	20.00% 3
Nombre total de participants: 15		

Q4 Chez un enfant ou un adolescent traité par Méthylphénidate

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)

Écart-type
0.00

Difficulté
5/5


CHOIX DE RÉPONSES

	SCORE	RÉPONSES
La survenue d'un trouble d'endormissement est rare et justifie l'arrêt du traitement	0/1	0.00% 0
La survenue de céphalées en fin de journée impose l'arrêt du traitement pour une ré évaluation plus complète de la situation	0/1	0.00% 0
La perte d'appétit quand elle est liée au traitement survient sur les quatre repas de la journée	0/1	0.00% 0
✓ Les difficultés d'endormissement sont fréquentes et peuvent être améliorées par une supplémentation par Mélatonine	1/1	100.00% 15
La supplémentation par Mélatonine exige en cas de trouble d'endormissement de recourir à la prescription d'une forme à libération retardée	0/1	6.67% 1

Nombre total de participants: 15

Q5 La prescription du Méthylphénidate

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
87%

Score moyen
2.9/3.0 (96%)


Écart-type
0.35

Difficulté
4/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Se fait pour une durée de 28 jours, avec renouvellement autorisé jusqu'à deux fois.	0/3	6.67% 1
✓ Se fait sur ordonnance sécurisée	1/3	100.00% 15
✓ Nécessite d'inscrire le nom de la pharmacie sur l'ordonnance	1/3	100.00% 15
Peut se faire pour une durée de trois mois, éventuellement renouvelable une fois	0/3	0.00% 0
✓ Nécessite d'inscrire sur l'ordonnance le nombre de lignes de prescription	1/3	86.67% 13
Nombre total de participants: 15		

Q6 Le médecin qui rédige la prescription mensuelle de méthylphénidate, après la prescription initiale

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
67%

Score moyen
2.7/3.0 (89%)


Écart-type
0.49

Difficulté
3/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ Peut modifier la présentation galénique	1/3	73.33% 11
Doit respecter strictement le détail et le libellé de la primo prescription hospitalière	0/3	0.00% 0
✓ Peut modifier la dose prescrite	1/3	100.00% 15
Doit arrêter le traitement pour les vacances scolaires	0/3	0.00% 0
✓ Peut rédiger une ordonnance avant 28 jours en mentionnant «chevauchement autorisé».	1/3	93.33% 14
Nombre total de participants: 15		

Q7 Le médecin traitant

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
20%

Score moyen
2.5/4.0 (62%)

Écart-type
1.13

Difficulté
2/5

CHOIX DE RÉPONSES

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ Ne doit pas dépasser une dose de 60 mg sans en informer le médecin primo-prescripteur	1/4	46.67% 7
✓ En cas d'effet secondaire, peut passer d'une forme commerciale à l'autre (exemple du Concerta© au Quasym©) car les effets secondaires ne sont pas toujours les mêmes	1/4	66.67% 10
✓ Peut augmenter la dose sans en informer le médecin spécialiste primo-prescripteur.	1/4	80.00% 12
Doit baisser la dose en cas d'anorexie	0/4	26.67% 4
✓ Peut passer à une forme non-retard en cas d'effet secondaire en fin de journée (trouble d'endormissement par exemple).	1/4	53.33% 8
Nombre total de participants: 15		