

FICHE

Trouble du neurodéveloppement/ TDAH : Diagnostic et interventions thérapeutiques auprès des enfants et adolescents

Fiche de suivi du traitement méthylphénidate chez l'enfant

Validée par le Collège le 18 juillet 2024

Rappel des objectifs du traitement qui ont été initialement définis avec l'enfant et la famille :

- symptômes du TDAH (impulsivité, attention ou distractibilité)
- retentissements fonctionnels (comportements cibles, maison ou école)

Évaluer avec l'enfant puis avec le ou les parents

Spécialité de méthylphénidate et posologie	
Lors de l'initiation du traitement : quelle est la posologie apportant le meilleur bénéfice et le moins d'effets indésirables ?	
Observance Jours de prise Oublis ? Organisation : routine ? pilulier ?	
Adhésion Difficultés pour enfant/parents ? Si oui, pour quelle raison ?	
Efficacité En fonction des objectifs du traitement définis lors de l'initiation : <ul style="list-style-type: none"> - Enfant 	

<ul style="list-style-type: none"> ● Les objectifs sont-ils atteints ? ● Ressenti de l'enfant ? - Parents <ul style="list-style-type: none"> ● Les objectifs sont-ils atteints ? - Enseignant <ul style="list-style-type: none"> ● Le comportement et l'attention de l'enfant sont-ils modifiés en classe ? ● L'attitude de l'enfant s'est-elle modifiée avec les autres enfants ? ● L'enfant a-t-il amélioré ses apprentissages ? - Autre professionnel intervenant <ul style="list-style-type: none"> ● Le comportement et l'attention de l'enfant sont-ils modifiés en séance ? ● L'attitude de l'enfant s'est-elle modifiée avec les autres enfants (si groupe) ? ● L'enfant a-t-il amélioré ses performances ? 	
<p>Tolérance : enfant/parents</p> <p>L'appétit est-il modifié ?</p> <p>Le sommeil est-il modifié ?</p> <p>Autres effets rapportés (poids, taille, céphalées, nausées, douleurs abdominales, tremblements, palpitations, logorrhée, irritabilité...) ?</p>	

Pour information

Outils existants sur l'évaluation des EI :

- CADDRA : <https://www.caddra.ca/fr/public/children/l-evaluation/>
- <https://www.pharmacologie.sfpeada.fr/trouble/2/9>
- http://methylphenidate-guide.eu/langs/fr/downloads/MPH_Checklist_2_Ongoing_Monitoring_fr.pdf

À remplir chaque semaine : par l'enfant avec le parent pour jeunes enfants, seul pour les plus grands et adolescents

Semaine : Du Au	Spécialité/posologie Heure prise Délai par rapport au repas	Effet sur période scolaire/apprentissage ¹	Effet sur période fin de journée/devoirs ¹	Effet sur appétit ²	Effet sur sommeil ³	Effets indésirables : Lesquels Délai d'apparition par rapport à prise de TTT	Commentaires

1 Effet du traitement : E3 très bien, E2 moyen, E1 mauvais

2 Appétit : A3 normal, A2 un peu diminué, A1 très diminué

3 Sommeil : S3 normal, S2 un peu perturbé, S1 très perturbé

Trouble du neurodéveloppement/ TDAH : Diagnostic et interventions thérapeutiques auprès des enfants et adolescents, Méthode, juillet 2024

Toutes nos publications sont téléchargeables sur www.has-sante.fr



Développer la qualité dans le champ
sanitaire, social et médico-social