


Quizz Pré Post test Méthylphénidate 2024

Résumé du quiz



Statistiques

Score le plus bas
45%

Médiane
73%

Score le plus élevé
100%

Moyenne: 72%


Écart-type: 14%

Classement des questions

| QUESTIONS (5) | DIFFICULTÉ | SCORE MOYEN |
|--|------------|-------------|
| Q7 les effets secondaires de l'atomoxétine peuvent être | 1 | 58% |
| Q6 L'effet de l'atomoxétine se manifeste | 2 | 67% |
| Q3 A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de méthylphénidate nécessite | 3 | 69% |
| Q4 Chez un enfant ou un adolescent traité par Méthylphénidate | 4 | 83% |
| Q5 En cas d'effet rebond important en fin de journée avec le méthylphénidate | 5 | 86% |

Q3 A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de méthylphénidate nécessite

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
17%

Score moyen
2.1/3.0 (69%)


Écart-type
0.51

Difficulté
3/5

| CHOIX DE RÉPONSES | SCORE | RÉPONSES |
|---|-------|------------|
| Un contrôle régulier des fonctions hépatiques et rénales. | 0/3 | 0.00% 0 |
| ✓ Un avis cardiologique préalable en cas d'antécédents de trouble du rythme ou de la conduction cardiaque | 1/3 | 58.33% 7 |
| Un arrêt du traitement en cas d'anorexie même limitée au repas du midi | 0/3 | 0.00% 0 |
| ✓ D'adapter la posologie en fonction de l'efficacité et de la tolérance | 1/3 | 100.00% 12 |
| ✓ De ne pas dépasser la posologie de 2 mg/kg/jour | 1/3 | 50.00% 6 |
| Nombre total de participants: 12 | | |

Q4 Chez un enfant ou un adolescent traité par Méthylphénidate

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
83%

Score moyen
0.8/1.0 (83%)

Écart-type
0.39

Difficulté
4/5

CHOIX DE RÉPONSES

| CHOIX DE RÉPONSES | SCORE | RÉPONSES |
|--|-------|-----------|
| La survenue d'un trouble d'endormissement est rare et justifie l'arrêt du traitement | 0/1 | 0.00% 0 |
| La survenue de céphalées en fin de journée impose l'arrêt du traitement pour une réévaluation plus complète de la situation | 0/1 | 0.00% 0 |
| La perte d'appétit quand elle est liée au traitement survient sur les quatre repas de la journée | 0/1 | 8.33% 1 |
| ✓ Les difficultés d'endormissement sont fréquentes et peuvent être améliorées par une supplémentation par Mélatonine | 1/1 | 83.33% 10 |
| La supplémentation par Mélatonine exige en cas de trouble d'endormissement de recourir à la prescription d'une forme à libération retardée | 0/1 | 33.33% 4 |

Nombre total de participants: 12