


Quizz Pré Post test Méthylphénidate 2024

Résumé du quiz



Statistiques

Score le plus bas
36%

Médiane
55%

Score le plus élevé
91%

Moyenne: 58%


Écart-type: 16%

Classement des questions

QUESTIONS (5)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q6 L'effet de l'atomoxétine se manifeste	1	8%
Q7 les effets secondaires de l'atomoxétine peuvent être	2	44%
Q5 En cas d'effet rebond important en fin de journée avec le méthylphénidate	3	67%
Q3 A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de méthylphénidate nécessite	4	81%
Q4 Chez un enfant ou un adolescent traité par Méthylphénidate	5	83%

Q3 A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de méthylphénidate nécessite

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
50%

Score moyen
2.4/3.0 (81%)


Écart-type
0.67

Difficulté
4/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Un contrôle régulier des fonctions hépatiques et rénales.	0/3	0.00% 0
✓ Un avis cardiologique préalable en cas d'antécédents de trouble du rythme ou de la conduction cardiaque	1/3	83.33% 10
Un arrêt du traitement en cas d'anorexie même limitée au repas du midi	0/3	8.33% 1
✓ D'adapter la posologie en fonction de l'efficacité et de la tolérance	1/3	100.00% 12
✓ De ne pas dépasser la posologie de 2 mg/kg/jour	1/3	58.33% 7
Nombre total de participants: 12		

Q4 Chez un enfant ou un adolescent traité par Méthylphénidate

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
83%

Score moyen
0.8/1.0 (83%)

Écart-type
0.39

Difficulté
5/5

CHOIX DE RÉPONSES

	SCORE	RÉPONSES
La survenue d'un trouble d'endormissement est rare et justifie l'arrêt du traitement	0/1	0.00% 0
La survenue de céphalées en fin de journée impose l'arrêt du traitement pour une ré évaluation plus complète de la situation	0/1	33.33% 4
La perte d'appétit quand elle est liée au traitement survient sur les quatre repas de la journée	0/1	16.67% 2
✓ Les difficultés d'endormissement sont fréquentes et peuvent être améliorées par une supplémentation par Mélatonine	1/1	83.33% 10
La supplémentation par Mélatonine exige en cas de trouble d'endormissement de recourir à la prescription d'une forme à libération retardée	0/1	25.00% 3
Nombre total de participants: 12		