


Résumé du quiz

Score moyen

92% • 12.8/14 PTS



Statistiques

Score le plus bas	Médiane	Score le plus élevé
79%	93%	100%

Moyenne: 92%


Écart-type: 6%

Classement des questions

QUESTIONS (10)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q4 Un enfant TDAH peut très bien être hyperactif seulement à l'école ou seulement à la maison	1	64%
Q9 Quels sont les effets secondaires possibles du traitement par méthylphénidate	2	84%
Q7 Il est exceptionnel qu'un enfant hyperactif soit calme dans le cabinet du médecin	3	86%
Q1 Il est indispensable de pratiquer un bilan neuropsychologique pour faire le diagnostic de TDAH	4	95%
Q2 les symptômes du TDAH commencent avant 12 ans	5	100%
Q3 Devant un enfant TDAH, il faut toujours s'assurer qu'il a des apprentissages normaux	5	100%
Q5 Il existe des formes de TDAH sans hyperactivité	5	100%
Q6 Les troubles du spectre autistique sont souvent associés avec le TDAH	5	100%
Q8 Quel bilan paraclinique faut-il faire systématiquement avant la mise sous méthylphénidate (QCM plusieurs réponses justes possibles))	5	100%
Q10 Quelles sont les prises en charge validées du TDAH	5	100%

Q1 Il est indispensable de pratiquer un bilan neuropsychologique pour faire le diagnostic de TDAH

Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
95%

Score moyen
1.0/1.0 (95%)


Écart-type
0.21

Difficulté
4/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
OUI	0/1	4.55% 1
✓ NON	1/1	95.45% 21
je ne sais pas	0/1	0.00% 0
Nombre total de participants: 22		

Q2 les symptômes du TDAH commencent avant 12 ans

Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
5/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ OUI	1/1	100.00%	22
NON	0/1	0.00%	0
je ne sais pas	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 22			

Q3 Devant un enfant TDAH, il faut toujours s'assurer qu'il a des apprentissages normaux

Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
5/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ OUI	1/1	100.00% 22
NON	0/1	0.00% 0
je ne sais pas	0/1	0.00% 0
Nombre total de participants: 22		

Q4 Un enfant TDAH peut très bien être hyperactif seulement à l'école ou seulement à la maison

Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
64%

Score moyen
0.6/1.0 (64%)


Écart-type
0.49

Difficulté
1/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
oui	0/1	36.36%	8
✓ non	1/1	63.64%	14
je ne sais pas	0/1	0.00%	0
TOTAL			22

Q5 Il existe des formes de TDAH sans hyperactivité

Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
5/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ OUI	1/1	100.00%	22
NON	0/1	0.00%	0
je ne sais pas	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 22			

Q6 Les troubles du spectre autistique sont souvent associés avec le TDAH

Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
5/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ OUI	1/1	100.00%	22
NON	0/1	0.00%	0
je ne sais pas	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 22			

Q7 Il est exceptionnel qu'un enfant hyperactif soit calme dans le cabinet du médecin

Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
86%

Score moyen
0.9/1.0 (86%)


Écart-type
0.35

Difficulté
3/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
OUI	0/1	13.64%	3
✓ NON	1/1	86.36%	19
je ne sais pas	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 22			

Q8 Quel bilan paraclinique faut-il faire systématiquement avant la mise sous méthylphénidate (QCM plusieurs réponses justes possibles))

Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
5/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Aucun des éléments ci-dessus	1/1	100.00%	22
dosage de fer sanguin avec ferritinémie	0/1	0.00%	0
NFP	0/1	0.00%	0
créatininémie	0/1	0.00%	0
EEG	0/1	0.00%	0
ECG	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 22			

Q9 Quels sont les effets secondaires possibles du traitement par méthylphénidate

Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
41%

Score moyen
3.4/4.0 (84%)


Écart-type
0.58

Difficulté
2/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Aucun des éléments ci-dessus	0/4	0.00%	0
✓ l'anorexie	1/4	100.00%	22
la toxicomanie à l'âge adulte	0/4	4.55%	1
✓ les tics	1/4	40.91%	9
✓ des douleurs abdominales en début de traitement	1/4	100.00%	22
✓ des difficultés d'endormissement	1/4	95.45%	21
Nombre total de participants: 22			

Q10 Quelles sont les prises en charge validées du TDAH

Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
2.0/2.0 (100%)

Écart-type
0.00

Difficulté
5/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
le neurofeed-back	0/2	4.55%	1
la remédiation neuropsychologique	0/2	95.45%	21
✓ le traitement par méthylphénidate	1/2	100.00%	22
✓ les groupes parentaux type groupes Barkley	1/2	100.00%	22
Nombre total de participants: 22			