


Q3 A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de méthylphénidate nécessite

Réponses obtenues : 726 Question(s) ignorée(s) : 2



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
28%

Score moyen
2.1/3.0 (71%)


Écart-type
0.65

Difficulté
3/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Un contrôle régulier des fonctions hépatiques et rénales.	0/3	4.55% 33
✓ Un avis cardiologique préalable en cas d'antécédents de trouble du rythme ou de la conduction cardiaque	1/3	79.34% 576
Un arrêt du traitement en cas d'anorexie même limitée au repas du midi	0/3	8.26% 60
✓ D'adapter la posologie en fonction de l'efficacité et de la tolérance	1/3	97.38% 707
✓ De ne pas dépasser la posologie de 2 mg/kg/jour	1/3	35.67% 259
Nombre total de participants: 726		

Q4 Chez un enfant ou un adolescent traité par Méthylphénidate

Réponses obtenues : 723 Question(s) ignorée(s) : 5



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
93%

Score moyen
0.9/1.0 (94%)


Écart-type
0.24

Difficulté
5/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
La survenue d'un trouble d'endormissement est rare et justifie l'arrêt du traitement	0/1	2.63% 19
La survenue de céphalées en fin de journée impose l'arrêt du traitement pour une ré évaluation plus complète de la situation	0/1	14.25% 103
La perte d'appétit quand elle est liée au traitement survient sur les quatre repas de la journée	0/1	10.10% 73
✓ Les difficultés d'endormissement sont fréquentes et peuvent être améliorées par une supplémentation par Mélatonine	1/1	93.78% 678
La supplémentation par Mélatonine exige en cas de trouble d'endormissement de recourir à la prescription d'une forme à libération retardée	0/1	12.31% 89
Nombre total de participants: 723		


Q5 En cas d'effet rebond important en fin de journée avec le méthylphénidate

Réponses obtenues : 728 Question(s) ignorée(s) : 0



Q6 L'effet de l'atomoxétine se manifeste


Réponses obtenues : 727 Question(s) ignorée(s) : 1



Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 83%		Score moyen 0.8/1.0 (83%)	Écart-type 0.37
		Difficulté 4/5	
CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
immédiatement, après 2 jours	0/1	67.26%	489
après 1 semaine	0/1	14.44%	105
✓ après 3 à 6 semaines	1/1	83.49%	607
après 2 à 3 mois	0/1	3.99%	29
ne sait pas	0/1	77.17%	561
Nombre total de participants: 727			

Q7 les effets secondaires de l'atomoxétine peuvent être

Réponses obtenues : 714 Question(s) ignorée(s) : 14



Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 39%		Score moyen 2.0/3.0 (68%)	Écart-type 0.96
		Difficulté 2/5	
CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
une sédation trop importante	0/3	50.70%	362
✓ des nausées	1/3	75.91%	542
✓ des douleurs abdominales	1/3	66.81%	477
des troubles de l'humeur	0/3	38.38%	274
✓ des céphalées	1/3	60.64%	433
Nombre total de participants: 714			