


Résumé du quiz



Statistiques

Score le plus bas	Médiane	Score le plus élevé
50%	79%	100%

Moyenne: 78%


Écart-type: 13%

Classement des questions

QUESTIONS (10)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q1 Il est indispensable de pratiquer un bilan neuropsychologique pour faire le diagnostic de TDAH	1	55%
Q4 Un enfant TDAH peut très bien être hyperactif seulement à l'école ou seulement à la maison	2	64%
Q9 Quels sont les effets secondaires possibles du traitement par méthylphénidate	3	65%
Q8 Quel bilan paraclinique faut-il faire systématiquement avant la mise sous méthylphénidate (QCM plusieurs réponses justes possibles)	4	73%
Q7 Il est exceptionnel qu'un enfant hyperactif soit calme dans le cabinet du médecin	5	77%
Q6 Les troubles du spectre autistique sont souvent associés avec le TDAH	6	86%
Q10 Quelles sont les prises en charge validées du TDAH	7	91%
Q2 les symptômes du TDAH commencent avant 12 ans	8	100%
Q3 Devant un enfant TDAH, il faut toujours s'assurer qu'il a des apprentissages normaux	8	100%
Q5 Il existe des formes de TDAH sans hyperactivité	8	100%

Q1 Il est indispensable de pratiquer un bilan neuropsychologique pour faire le diagnostic de TDAH

Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
55%

Score moyen
0.5/1.0 (55%)


Écart-type
0.51

Difficulté
1/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
OUI	0/1	45.45%	10
✓ NON	1/1	54.55%	12
je ne sais pas	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 22			

Q2 les symptômes du TDAH commencent avant 12 ans

Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
8/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ OUI	1/1	100.00%	22
NON	0/1	0.00%	0
je ne sais pas	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 22			

Q3 Devant un enfant TDAH, il faut toujours s'assurer qu'il a des apprentissages normaux

Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
8/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ OUI	1/1	100.00%	22
NON	0/1	0.00%	0
je ne sais pas	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 22			

Q4 Un enfant TDAH peut très bien être hyperactif seulement à l'école ou seulement à la maison

Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
64%

Score moyen
0.6/1.0 (64%)


Écart-type
0.49

Difficulté
2/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
oui	0/1	36.36%	8
✓ non	1/1	63.64%	14
je ne sais pas	0/1	0.00%	0
TOTAL			22

Q5 Il existe des formes de TDAH sans hyperactivité

Réponses obtenues : 21 Question(s) ignorée(s) : 1



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
95%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
8/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ OUI	1/1	100.00%	21
NON	0/1	0.00%	0
je ne sais pas	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 21			

Q6 Les troubles du spectre autistique sont souvent associés avec le TDAH

Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
86%

Score moyen
0.9/1.0 (86%)


Écart-type
0.35

Difficulté
6/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ OUI	1/1	86.36%	19
NON	0/1	13.64%	3
je ne sais pas	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 22			

Q7 Il est exceptionnel qu'un enfant hyperactif soit calme dans le cabinet du médecin

Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
77%

Score moyen
0.8/1.0 (77%)


Écart-type
0.43

Difficulté
5/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
OUI	0/1	18.18%	4
✓ NON	1/1	77.27%	17
je ne sais pas	0/1	4.55%	1
Nombre total de participants: 22			

Q8 Quel bilan paraclinique faut-il faire systématiquement avant la mise sous méthylphénidate (QCM plusieurs réponses justes possibles)

Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
73%

Score moyen
0.7/1.0 (73%)


Écart-type
0.46

Difficulté
4/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Aucun des éléments ci-dessus	1/1	72.73%	16
dosage de fer sanguin avec ferritinémie	0/1	9.09%	2
NFP	0/1	9.09%	2
créatininémie	0/1	4.55%	1
EEG	0/1	0.00%	0
ECG	0/1	27.27%	6
Nombre total de participants: 22			

Q9 Quels sont les effets secondaires possibles du traitement par méthylphénidate

Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
27%

Score moyen
2.6/4.0 (65%)


Écart-type
1.10

Difficulté
3/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Aucun des éléments ci-dessus	0/4	0.00%	0
✓ l'anorexie	1/4	95.45%	21
la toxicomanie à l'âge adulte	0/4	4.55%	1
✓ les tics	1/4	31.82%	7
✓ des douleurs abdominales en début de traitement	1/4	63.64%	14
✓ des difficultés d'endormissement	1/4	68.18%	15
Nombre total de participants: 22			

Q10 Quelles sont les prises en charge validées du TDAH

Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
82%

Score moyen
1.8/2.0 (91%)

Écart-type
0.39

Difficulté
7/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
le neurofeed-back	0/2	27.27%	6
la remédiation neuropsychologique	0/2	45.45%	10
✓ le traitement par méthylphénidate	1/2	95.45%	21
✓ les groupes parentaux type groupes Barkley	1/2	86.36%	19
Nombre total de participants: 22			