


Q3 A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de méthylphénidate nécessite

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
31%

Score moyen
2.2/3.0 (74%)


Écart-type
0.60

Difficulté
4/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Un contrôle régulier des fonctions hépatiques et rénales.	0/3	7.69% 1
✓ Un avis cardiologique préalable en cas d'antécédents de trouble du rythme ou de la conduction cardiaque	1/3	76.92% 10
Un arrêt du traitement en cas d'anorexie même limitée au repas du midi	0/3	0.00% 0
✓ D'adapter la posologie en fonction de l'efficacité et de la tolérance	1/3	100.00% 13
✓ De ne pas dépasser la posologie de 2 mg/kg/jour	1/3	46.15% 6
Nombre total de participants: 13		

Q4 Chez un enfant ou un adolescent traité par Méthylphénidate

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)

Écart-type
0.00

Difficulté
5/5


CHOIX DE RÉPONSES

	SCORE	RÉPONSES
La survenue d'un trouble d'endormissement est rare et justifie l'arrêt du traitement	0/1	0.00% 0
La survenue de céphalées en fin de journée impose l'arrêt du traitement pour une ré évaluation plus complète de la situation	0/1	23.08% 3
La perte d'appétit quand elle est liée au traitement survient sur les quatre repas de la journée	0/1	15.38% 2
✓ Les difficultés d'endormissement sont fréquentes et peuvent être améliorées par une supplémentation par Mélatonine	1/1	100.00% 13
La supplémentation par Mélatonine exige en cas de trouble d'endormissement de recourir à la prescription d'une forme à libération retardée	0/1	30.77% 4

Nombre total de participants: 13

Q5 En cas d'effet rebond important en fin de journée avec le méthylphénidate

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
31%

Score moyen
2.2/3.0 (72%)


Écart-type
0.69

Difficulté
3/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Il faut arrêter le traitement	0/3	0.00% 0
✓ On peut changer de forme galénique	1/3	69.23% 9
✓ On peut rajouter un peu de méthylphénidate retard à midi	1/3	61.54% 8
✓ on peut rajouter un peu de méthylphénidate à effet immédiat à 17h	1/3	84.62% 11
Il faut d'emblée passer à l'atomoxétine	0/3	0.00% 0
Nombre total de participants: 13		

Q6 L'effet de l'atomoxétine se manifeste

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
8%

Score moyen
0.1/1.0 (8%)


Écart-type
0.28

Difficulté
1/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
immédiatement, après 2 jours	0/1	7.69%	1
après 1 semaine	0/1	7.69%	1
✓ après 3 à 6 semaines	1/1	7.69%	1
après 2 à 3 mois	0/1	0.00%	0
ne sait pas	0/1	76.92%	10
Nombre total de participants: 13			

Q7 les effets secondaires de l'atomoxétine peuvent être

Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 2



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
8%

Score moyen
1.2/3.0 (39%)

Écart-type
1.08

Difficulté
2/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
une sédation trop importante	0/3	36.36%	4
✓ des nausées	1/3	36.36%	4
✓ des douleurs abdominales	1/3	54.55%	6
des troubles de l'humeur	0/3	36.36%	4
✓ des céphalées	1/3	27.27%	3
Nombre total de participants: 11			