


Résumé du quiz



Statistiques

Score le plus bas	Médiane	Score le plus élevé
27%	64%	100%

Moyenne: 67%


Écart-type: 21%

Classement des questions

QUESTIONS (5)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q6 L'effet de l'atomoxétine se manifeste	1	33%
Q3 A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de méthylphénidate nécessite	2	64%
Q7 les effets secondaires de l'atomoxétine peuvent être	3	67%
Q5 En cas d'effet rebond important en fin de journée avec le méthylphénidate	4	73%
Q4 Chez un enfant ou un adolescent traité par Méthylphénidate	5	100%

Q3 A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de méthylphénidate nécessite

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
20%

Score moyen
1.9/3.0 (64%)

Écart-type
0.70

Difficulté
2/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Un contrôle régulier des fonctions hépatiques et rénales.	0/3	0.00% 0
✓ Un avis cardiologique préalable en cas d'antécédents de trouble du rythme ou de la conduction cardiaque	1/3	60.00% 9
Un arrêt du traitement en cas d'anorexie même limitée au repas du midi	0/3	0.00% 0
✓ D'adapter la posologie en fonction de l'efficacité et de la tolérance	1/3	86.67% 13
✓ De ne pas dépasser la posologie de 2 mg/kg/jour	1/3	46.67% 7
Nombre total de participants: 15		

Q4 Chez un enfant ou un adolescent traité par Méthylphénidate

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)

Écart-type
0.00

Difficulté
5/5


CHOIX DE RÉPONSES

	SCORE	RÉPONSES
La survenue d'un trouble d'endormissement est rare et justifie l'arrêt du traitement	0/1	0.00% 0
La survenue de céphalées en fin de journée impose l'arrêt du traitement pour une réévaluation plus complète de la situation	0/1	0.00% 0
La perte d'appétit quand elle est liée au traitement survient sur les quatre repas de la journée	0/1	0.00% 0
✓ Les difficultés d'endormissement sont fréquentes et peuvent être améliorées par une supplémentation par Mélatonine	1/1	100.00% 15
La supplémentation par Mélatonine exige en cas de trouble d'endormissement de recourir à la prescription d'une forme à libération retardée	0/1	6.67% 1

Nombre total de participants: 15

Q5 En cas d'effet rebond important en fin de journée avec le méthylphénidate

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
40%

Score moyen
2.2/3.0 (73%)


Écart-type
0.77

Difficulté
4/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Il faut arrêter le traitement	0/3	0.00% 0
✓ On peut changer de forme galénique	1/3	93.33% 14
✓ On peut rajouter un peu de méthylphénidate retard à midi	1/3	46.67% 7
✓ on peut rajouter un peu de méthylphénidate à effet immédiat à 17h	1/3	80.00% 12
Il faut d'emblée passer à l'atomoxétine	0/3	0.00% 0
Nombre total de participants: 15		

Q6 L'effet de l'atomoxétine se manifeste

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
33%

Score moyen
0.3/1.0 (33%)


Écart-type
0.49

Difficulté
1/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
immédiatement, après 2 jours	0/1	6.67%	1
après 1 semaine	0/1	13.33%	2
✓ après 3 à 6 semaines	1/1	33.33%	5
après 2 à 3 mois	0/1	13.33%	2
ne sait pas	0/1	33.33%	5
Nombre total de participants: 15			

Q7 les effets secondaires de l'atomoxétine peuvent être

Réponses obtenues : 14 Question(s) ignorée(s) : 1



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
53%

Score moyen
2.0/3.0 (67%)

Écart-type
1.30

Difficulté
3/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
une sédation trop importante	0/3	35.71%	5
✓ des nausées	1/3	71.43%	10
✓ des douleurs abdominales	1/3	64.29%	9
des troubles de l'humeur	0/3	42.86%	6
✓ des céphalées	1/3	64.29%	9
Nombre total de participants: 14			