


Résumé du quiz




Statistiques		
Score le plus bas	Médiane	Score le plus élevé
27%	45%	73%
Moyenne: 48%		
Écart-type: 15%		

Classement des questions

QUESTIONS (5)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q6 L'effet de l'atomoxétine se manifeste	1	0%
Q7 les effets secondaires de l'atomoxétine peuvent être	2	26%
Q5 En cas d'effet rebond important en fin de journée avec le méthylphénidate	3	53%
Q3 A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de méthylphénidate nécessite	4	67%
Q4 Chez un enfant ou un adolescent traité par Méthylphénidate	5	93%

Q3 A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de méthylphénidate nécessite

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
20%

Score moyen
2.0/3.0 (67%)


Écart-type
0.65

Difficulté
4/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Un contrôle régulier des fonctions hépatiques et rénales.	0/3	13.33% 2
✓ Un avis cardiologique préalable en cas d'antécédents de trouble du rythme ou de la conduction cardiaque	1/3	80.00% 12
Un arrêt du traitement en cas d'anorexie même limitée au repas du midi	0/3	6.67% 1
✓ D'adapter la posologie en fonction de l'efficacité et de la tolérance	1/3	93.33% 14
✓ De ne pas dépasser la posologie de 2 mg/kg/jour	1/3	26.67% 4
Nombre total de participants: 15		

Q4 Chez un enfant ou un adolescent traité par Méthylphénidate

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
93%

Score moyen
0.9/1.0 (93%)


Écart-type
0.26

Difficulté
5/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
La survenue d'un trouble d'endormissement est rare et justifie l'arrêt du traitement	0/1	0.00% 0
La survenue de céphalées en fin de journée impose l'arrêt du traitement pour une ré évaluation plus complète de la situation	0/1	13.33% 2
La perte d'appétit quand elle est liée au traitement survient sur les quatre repas de la journée	0/1	13.33% 2
✓ Les difficultés d'endormissement sont fréquentes et peuvent être améliorées par une supplémentation par Mélatonine	1/1	93.33% 14
La supplémentation par Mélatonine exige en cas de trouble d'endormissement de recourir à la prescription d'une forme à libération retardée	0/1	33.33% 5
Nombre total de participants: 15		

Q5 En cas d'effet rebond important en fin de journée avec le méthylphénidate

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
7%

Score moyen
1.6/3.0 (53%)


Écart-type
0.74

Difficulté
3/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Il faut arrêter le traitement	0/3	6.67%	1
✓ On peut changer de forme galénique	1/3	80.00%	12
✓ On peut rajouter un peu de méthylphénidate retard à midi	1/3	26.67%	4
✓ on peut rajouter un peu de méthylphénidate à effet immédiat à 17h	1/3	53.33%	8
Il faut d'emblée passer à l'atomoxétine	0/3	0.00%	0
Nombre total de participants: 15			

Q6 L'effet de l'atomoxétine se manifeste

Réponses obtenues : 15 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes	Score moyen	Écart-type	Difficulté
0%	0.0/1.0 (0%)	0.00	1/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
immédiatement, après 2 jours	0/1	0.00%	0
après 1 semaine	0/1	0.00%	0
✓ après 3 à 6 semaines	1/1	0.00%	0
après 2 à 3 mois	0/1	0.00%	0
ne sait pas	0/1	100.00%	15
Nombre total de participants: 15			

Q7 les effets secondaires de l'atomoxétine peuvent être

Réponses obtenues : 14 Question(s) ignorée(s) : 1



Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 7%		Score moyen 0.8/3.0 (26%)	Écart-type 1.05
		Difficulté 2/5	
CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
une sédation trop importante	0/3	64.29%	9
✓ des nausées	1/3	14.29%	2
✓ des douleurs abdominales	1/3	28.57%	4
des troubles de l'humeur	0/3	42.86%	6
✓ des céphalées	1/3	35.71%	5
Nombre total de participants: 14			