


Q3 A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de méthylphénidate nécessite

Réponses obtenues : 14 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
36%

Score moyen
2.2/3.0 (74%)


Écart-type
0.80

Difficulté
4/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Un contrôle régulier des fonctions hépatiques et rénales.	0/3	7.14% 1
✓ Un avis cardiologique préalable en cas d'antécédents de trouble du rythme ou de la conduction cardiaque	1/3	85.71% 12
Un arrêt du traitement en cas d'anorexie même limitée au repas du midi	0/3	0.00% 0
✓ D'adapter la posologie en fonction de l'efficacité et de la tolérance	1/3	92.86% 13
✓ De ne pas dépasser la posologie de 2 mg/kg/jour	1/3	42.86% 6
Nombre total de participants: 14		

Q4 Chez un enfant ou un adolescent traité par Méthylphénidate

Réponses obtenues : 14 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
93%

Score moyen
0.9/1.0 (93%)


Écart-type
0.27

Difficulté
5/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
La survenue d'un trouble d'endormissement est rare et justifie l'arrêt du traitement	0/1	0.00% 0
La survenue de céphalées en fin de journée impose l'arrêt du traitement pour une réévaluation plus complète de la situation	0/1	14.29% 2
La perte d'appétit quand elle est liée au traitement survient sur les quatre repas de la journée	0/1	21.43% 3
✓ Les difficultés d'endormissement sont fréquentes et peuvent être améliorées par une supplémentation par Mélatonine	1/1	92.86% 13
La supplémentation par Mélatonine exige en cas de trouble d'endormissement de recourir à la prescription d'une forme à libération retardée	0/1	28.57% 4
Nombre total de participants: 14		

Q5 En cas d'effet rebond important en fin de journée avec le méthylphénidate

Réponses obtenues : 14 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
21%

Score moyen
1.8/3.0 (60%)


Écart-type
0.80

Difficulté
3/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Il faut arrêter le traitement	0/3	0.00%	0
✓ On peut changer de forme galénique	1/3	71.43%	10
✓ On peut rajouter un peu de méthylphénidate retard à midi	1/3	64.29%	9
✓ on peut rajouter un peu de méthylphénidate à effet immédiat à 17h	1/3	42.86%	6
Il faut d'emblée passer à l'atomoxétine	0/3	0.00%	0
Nombre total de participants: 14			

Q6 L'effet de l'atomoxétine se manifeste


Réponses obtenues : 14 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 7%		Score moyen 0.1/1.0 (7%)	Écart-type 0.27
		Difficulté 1/5	
CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
immédiatement, après 2 jours	0/1	0.00%	0
après 1 semaine	0/1	7.14%	1
✓ après 3 à 6 semaines	1/1	7.14%	1
après 2 à 3 mois	0/1	0.00%	0
ne sait pas	0/1	85.71%	12
Nombre total de participants: 14			

Q7 les effets secondaires de l'atomoxétine peuvent être

Réponses obtenues : 13 Question(s) ignorée(s) : 1



Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 14%		Score moyen 1.2/3.0 (38%)	Écart-type 1.14
		Difficulté 2/5	
CHOIX DE RÉPONSES		SCORE	RÉPONSES
une sédation trop importante		0/3	30.77% 4
✓	des nausées	1/3	30.77% 4
✓	des douleurs abdominales	1/3	46.15% 6
	des troubles de l'humeur	0/3	53.85% 7
✓	des céphalées	1/3	38.46% 5
Nombre total de participants: 13			