


Résumé du quiz



Statistiques		
Score le plus bas	Médiane	Score le plus élevé
52%	69%	77%
Moyenne: 67%		
Écart-type: 8%		

Classement des questions

QUIZ Allergie respiratoire de l'enfant rhinite et asthme 27-28 novembre 2024

QUESTIONS (13)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q7 (EFR) Quels éléments d'exploration fonctionnelle respiratoire vont vous servir à savoir si l'asthme de Nathan âgé de 6 ans, est bien contrôlé ? (Une ou plusieurs réponses vraies)	1	28%
Q8 (Traitement de fond) Il existe de nombreux dispositifs d'inhalation et modalités de traitement dans l'asthme ; choisissez la réponse vraie.	2	33%
Q3 Yun, 18 mois, est hospitalisé pour un deuxième épisode sifflant fébrile. Quelle est la réponse vraie ?	3	42%
Q15 EFR- Vous recevez ce résultat de l'EFR établie chez un de vos patients de 9 ans : la courbe rouge est celle tracée en première intention, la courbe bleue est celle obtenue 20 minutes après 4 bouffées de Ventoline®. Quelles sont vos conclusions ?	4	47%
Q4 Gabin a 22 mois, pèse 12 kg. Il a un traitement de fond par Fluticasone 50µg x 2 matin et soir, Salbutamol si besoin, et des cures courtes de corticoïdes oraux (3 par an environ). Les parents vous l'amènent le matin, car il a passé une mauvaise nuit, a beaucoup toussé et le salbutamol qu'ils ont répété régulièrement leur semble inefficace. Vous faites les constatations suivantes : Fréquence respiratoire à 70/minute Blocage expiratoire Bruit respiratoire diminué des deux côtés Nourrisson agité Pas de signe infectieux évident. Quelle conduite à tenir envisagez vous ?	5	50%
Q14 Kévin 14 ans est asthmatique depuis ses 4 ans , il a un traitement de fond depuis 2 ans identique avec des EFR normales. Depuis 6 mois il tousse la nuit , a arrêté de faire du sport car il se sent gêné et ses parents ont déclenché 3 fois le plan d'action sans aller jusqu'aux corticoïdes ; quelles sont les réponses vraies ?	6	58%
Q5 (Asthme de l'enfant) Quels éléments et examens sont utiles pour le diagnostic d'un asthme et de ses facteurs déclenchants ?	7	75%
Q13 (Asthme et allergie) Emilie 6 ans vient pour un premier rendez-vous pour prise en charge de son asthme , elle bénéficie de prick-tests qui sont positifs aux acariens, graminées , au chat et au lait ; quelle est la réponse vraie ?	7	75%
Q12 Concernant les techniques d'inhalation dans l'asthme, quelles sont les réponses vraies ? cf image	9	81%
Q11 Emilie 4 ans, a un asthme : quelles sont les réponses vraies ?	10	83%
Q6 Vous examinez un adolescent de 13 ans qui va fréquemment aux urgences pour son asthme. Il vient consulter pour le renouvellement de son traitement qui comporte : un traitement de fond avec une corticothérapie inhalée associée à des β2 mimétiques de longue durée d'action, et un traitement des crises avec des broncho-dilatateurs inhalés de courte durée d'action (salbutamol).	11	88%
Q9 (Contrôle) Kévin 6 ans vient vous voir pour le suivi de son asthme; une seule réponse est vraie ?	12	92%
Q10 (Suivi) Une ou plusieurs réponses vraies ?	13	96%

Q1 Prénom

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0

#	RÉPONSES	DATE
1	chloe	5/22/2025 2:04 PM
2	Dario	5/22/2025 11:17 AM
3	Anne-Claire	5/22/2025 9:27 AM
4	Lara	5/22/2025 9:26 AM
5	Annabelle	5/22/2025 9:23 AM
6	Nzola	5/22/2025 9:21 AM
7	Rafael	5/22/2025 9:20 AM
8	Sandrine	5/22/2025 9:11 AM
9	Anna	5/22/2025 9:11 AM
10	Stéphane	5/22/2025 9:10 AM
11	Sandrine	5/22/2025 8:53 AM
12	Daniela Nicoleta	5/22/2025 8:42 AM


Q2 Nom

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0

#	RÉPONSES	DATE
1	jousselme	5/22/2025 2:04 PM
2	FRANZONE	5/22/2025 11:17 AM
3	Alessis	5/22/2025 9:27 AM
4	Arnouk	5/22/2025 9:26 AM
5	Faure Bruntz	5/22/2025 9:23 AM
6	Nzunga	5/22/2025 9:21 AM
7	BASTERO	5/22/2025 9:20 AM
8	SEON GARI	5/22/2025 9:11 AM
9	Hubert Barrucand	5/22/2025 9:11 AM
10	Monteil	5/22/2025 9:10 AM
11	Le Guillou	5/22/2025 8:53 AM
12	Grigorescu	5/22/2025 8:42 AM

Q3 Yun, 18 mois, est hospitalisé pour un deuxième épisode sifflant fébrile.
Quelle est la réponse vraie ?

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes	Score moyen	Écart-type	Difficulté
42%	0.4/1.0 (42%)	0.51	3/13

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
1. C'est le deuxième mais il a moins de deux ans: c'est donc une bronchiolite aigue.	0/1	33.33%	4
✓ 2. Aucun examen n'est nécessaire pour faire un diagnostic.	1/1	41.67%	5
3. L'allergie est le principal facteur déclenchant de cet épisode.	0/1	0.00%	0
4. Il est sous oxygène : le seuil est fixé à 95% pour le sevrer en oxygène.	0/1	25.00%	3
5. Il a 38.5 depuis cet après-midi et une auscultation avec des sous-crépitations à gauche : vous débutez une antibiothérapie.	0/1	0.00%	0
TOTAL			12

Q4 Gabin a 22 mois, pèse 12 kg. Il a un traitement de fond par Fluticasone 50µg x 2 matin et soir, Salbutamol si besoin, et des cures courtes de corticoïdes oraux (3 par an environ). Les parents vous l'amènent le matin, car il a passé une mauvaise nuit, a beaucoup toussé et le salbutamol qu'ils ont répété régulièrement leur semble inefficace. Vous faites les constatations suivantes : Fréquence respiratoire à 70/minute Blocage expiratoire Bruit respiratoire diminué des deux côtés Nourrisson agité Pas de signe infectieux évident. Quelle conduite à tenir envisagez vous ?

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
50%

Score moyen
0.5/1.0 (50%)


Écart-type
0.52

Difficulté
5/13

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
1. Vous administrez au cabinet 2 bouffées de salbutamol et vous demandez à avoir des nouvelles dans l'après-midi.	0/1	0.00% 0
2. Vous l'envoyez directement à l'hôpital	0/1	33.33% 4
3. Vous administrez 2 bouffées de salbutamol que vous renouvelez au bout de 20 minutes et vous le gardez 30 minutes au cabinet avant de le renvoyer chez lui avec poursuite de son traitement habituel.	0/1	0.00% 0
14 Vous administrez 6 bouffées de salbutamol que vous renouvelez toutes les 20 minutes pendant 1 heure, vous donnez 1,5 mg/kg de corticoïdes per os, avant de le renvoyer chez lui avec poursuite de son traitement habituel.	0/1	16.67% 2
✓ 5. Vous appelez le SAMU pour le conduire à l'hôpital et en attendant vous administrez 6 bouffées de salbutamol que vous renouvelez 20 minutes plus tard, vous donnez 1 mg/kg de corticoïdes per os.	1/1	50.00% 6
TOTAL		12

Q5 (Asthme de l'enfant)Quels éléments et examens sont utiles pour le diagnostic d'un asthme et de ses facteurs déclenchants ?

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
42%

Score moyen
2.3/3.0 (75%)


Écart-type
0.75

Difficulté
7/13

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
1. Antécédents personnels de bronchiolite à 9 mois	0/3	58.33%	7
2. Scanner thoracique	0/3	0.00%	0
✓ 3. Radiographie thoracique	1/3	91.67%	11
4. Multitest sanguins aux pneumallergènes PHADIATOP®	0/3	25.00%	3
✓ 5. Prick tests aux pneumallergènes	1/3	66.67%	8
✓ 16. EFR	1/3	66.67%	8
Nombre total de participants: 12			

Q6 Vous examinez un adolescent de 13 ans qui va fréquemment aux urgences pour son asthme. Il vient consulter pour le renouvellement de son traitement qui comporte : un traitement de fond avec une corticothérapie inhalée associée à des β_2 mimétiques de longue durée d'action, et un traitement des crises avec des broncho-dilatateurs inhalés de courte durée d'action (salbutamol).

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
50%

Score moyen
5.3/6.0 (88%)


Écart-type
0.87

Difficulté
11/13

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ 1. Vous lui demandez de prendre son spray devant vous	1/6	91.67% 11
✓ 2. Vous réactivez la prise en charge éducative de sa maladie asthmatique	1/6	100.00% 12
✓ 3. Vous prescrivez une EFR	1/6	91.67% 11
✓ 4. Vous lui prescrivez une corticothérapie orale de secours en cas de crise sévère	1/6	58.33% 7
✓ 5. Vous recherchez des facteurs déclenchants environnementaux	1/6	100.00% 12
✓ 6. Vous expliquez la crise sévère avec des mots simples	1/6	83.33% 10
Nombre total de participants: 12		

Q7 (EFR) Quels éléments d'exploration fonctionnelle respiratoire vont vous servir à savoir si l'asthme de Nathan âgé de 6 ans, est bien contrôlé ?
(Une ou plusieurs réponses vraies)

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes	Score moyen	Écart-type	Difficulté
0%	0.8/3.0 (28%)	0.58	1/13

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
1. La pratique d'une EFR avec courbe débit volume n'est pas possible avant 7 ans.	0/3	8.33%	1
✓ 2. La recherche de l'effet des beta2-mimétiques sur le débit de pointe (DEP) mesuré au cabinet n'a pas d'intérêt.	1/3	8.33%	1
3. La mesure DEP de base doit être fait à chaque visite..	0/3	50.00%	6
✓ 4. La réversibilité d'un syndrome obstructif décelé au cours de l'EFR, définissant l'asthme, est la mesure d'une variation du VEMS de plus de 10% sous beta2mimétiques.	1/3	58.33%	7
✓ 5 La mesure des résistances pulmonaires peut être réalisée en routine dès 4 ans.	1/3	16.67%	2
Nombre total de participants: 12			

Q8 (Traitement de fond) Il existe de nombreux dispositifs d'inhalation et modalités de traitement dans l'asthme ; choisissez la réponse vraie.


Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 33%		Score moyen 0.3/1.0 (33%)	Écart-type 0.49
		Difficulté 2/13	
CHOIX DE RÉPONSES		SCORE	RÉPONSES
1. Avant 6 ans la chambre d'inhalation avec masque est la meilleure alternative		0/1	58.33% 7
2. Si l'enfant pleure lors d'une nébulisation c'est mieux il inhalera d'autant mieux		0/1	0.00% 0
3. Les systèmes poudres sont compatibles avec tous les patients		0/1	0.00% 0
4. Pour savoir si un aérosol doseur est vide il faut l'immerger dans l'eau		0/1	8.33% 1
✓ 5. Chaque dispositif doit être vérifié à chaque consultation		1/1	33.33% 4
TOTAL			12

Q9 (Contrôle) Kévin 6 ans vient vous voir pour le suivi de son asthme; une seule réponse est vraie ?

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
92%

Score moyen
0.9/1.0 (92%)


Écart-type
0.29

Difficulté
12/13

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
1. Lors du dernier mois il tousse juste la nuit de temps en temps et va bien le reste du temps : l'asthme est donc contrôlé	0/1	8.33% 1
2. Lors du dernier mois il a utilisé sa Ventoline® juste quelques fois après le sport et va bien le reste du temps : l'asthme est donc contrôlé	0/1	0.00% 0
3. Lors du dernier mois il a vu son médecin et a pris 2 jours de corticoïdes pour son asthme: l'asthme est contrôlé car il n'a eu besoin que de 2 jours de corticoïdes	0/1	0.00% 0
✓ 4. Il a une rhinite continue ; il est temps de la traiter pour ne pas perdre le contrôle de l'asthme	1/1	91.67% 11
5. Il a une rhinite continue, la traiter améliorera son confort et qualité de vie mais n'a pas d'influence sur l'asthme	0/1	0.00% 0
TOTAL		12

Q10 (Suivi) Une ou plusieurs réponses vraies ?


Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 92%		Score moyen 1.9/2.0 (96%)	Écart-type 0.29
		Difficulté 13/13	
CHOIX DE RÉPONSES		SCORE	RÉPONSES
1. La rédaction d'un PAI est obligatoire pour tout enfant asthmatique		0/2	75.00% 9
2. La trousse d'urgence d'un asthmatique à l'école doit contenir automatiquement un corticoïde per os		0/2	58.33% 7
✓	3. Le plan d'action doit être donné et expliqué au patient et sa famille	1/2	100.00% 12
✓	4. En cas de non contrôle je dois revoir mon patient à 1 mois	1/2	91.67% 11
5. En cas de contrôle un suivi à 1 an est indiqué		0/2	25.00% 3
Nombre total de participants: 12			

Q11 Émilie 4 ans, a un asthme : quelles sont les réponses vraies ?

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
67%Score moyen
1.7/2.0 (83%)Écart-type
0.49Difficulté
10/13

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
1. Il s'agit de la 2ème pathologie chronique la plus fréquente de l'enfant, après le diabète	0/2	25.00% 3
✓ 2. Le bilan complémentaire de son asthme comprend : Radiographie thoracique et prick-tests	1/2	75.00% 9
3. Le contrôle de son asthme est évalué à l'aide de 4 questions : symptômes diurnes, nocturnes, utilisation de broncho-dilatateurs de secours, comportement lors d'activités, au cours de la dernière année	0/2	83.33% 10
✓ 4. Les corticostéroïdes inhalés sont la base du traitement de fond dans l'asthme	1/2	91.67% 11
5. Les broncho-dilatateurs de courte durée d'action sont autorisés à partir de 4 ans	0/2	0.00% 0
Nombre total de participants: 12		

Q12 Concernant les techniques d'inhalation dans l'asthme, quelles sont les réponses vraies ? cf image


Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes 58%		Score moyen 2.4/3.0 (81%)	Écart-type 0.79	Difficulté 9/13
CHOIX DE RÉPONSES			SCORE	RÉPONSES
✓	1. Il s'agit d'un aérosol-doseur avec chambre d'inhalation sans masque facial		1/3	75.00% 9
✓	2. Cette technique permet d'augmenter le dépôt bronchique du médicament		1/3	75.00% 9
	3. C'est une technique recommandée pour les enfants de moins de 3 ans		0/3	0.00% 0
	4. L'aérosol-doseur sans chambre d'inhalation n'est possible qu'une fois la coordination main-poumon acquise		0/3	66.67% 8
✓	5. Lorsque l'asthme est non contrôlé, il faut toujours vérifier l'observance et la technique d'inhalation avant d'augmenter la pression thérapeutique		1/3	91.67% 11
Nombre total de participants: 12				

Q13 (Asthme et allergie) Emilie 6 ans vient pour un premier rendez-vous pour prise en charge de son asthme , elle bénéficie de prick-tests qui sont positifs aux acariens, graminées , au chat et au lait ; quelle est la réponse vraie ?


Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes		Score moyen	Écart-type
75%		0.8/1.0 (75%)	0.45
		Difficulté 7/13	
CHOIX DE RÉPONSES		SCORE	RÉPONSES
1. Elle est allergique aux acariens, chat et lait : il faut faire une éviction		0/1	0.00% 0
✓ 2. Il manque des données d'interrogatoire pour le diagnostic des allergies		1/1	75.00% 9
3. Le prick est positif au lait il faut faire des Ige spécifiques et faire une éviction stricte		0/1	0.00% 0
4. Vous pouvez proposer une désensibilisation aux acariens + graminées		0/1	0.00% 0
5. Le traitement doit comporter un anti-histaminique		0/1	25.00% 3
TOTAL			12

**Q14 Kévin 14 ans est asthmatique depuis ses 4 ans , il a un traitement de fond depuis 2 ans identique avec des EFR normales. Depuis 6 mois il tousse la nuit , a arrêté de faire du sport car il se sent gêné et ses parents ont déclenché 3 fois le plan d'action sans aller jusqu'aux corticoïdes ;
quelles sont les réponses vraies ?**

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
33%

Score moyen
1.2/2.0 (58%)


Écart-type
0.72

Difficulté
6/13

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
1. Son asthme est non contrôlé , vous l'adrezsez au spécialiste	0/2	75.00% 9
2. Vous augmentez la corticothérapie inhalée à 500 équivalent Fluticasone® matin et soir	0/2	33.33% 4
3. Vous proposez de faire des EFR à 3 mois et de réévaluer	0/2	33.33% 4
✓ 4. Vous vous reposez la question du diagnostic de l'asthme devant cette modification	1/2	33.33% 4
✓ 5. Vous vérifiez le mode de vie, l'observance	1/2	83.33% 10
Nombre total de participants: 12		

Q15 EFR- Vous recevez ce résultat de l'EFR établie chez un de vos patients de 9 ans : la courbe rouge est celle tracée en première intention, la courbe bleue est celle obtenue 20 minutes après 4 bouffées de Ventoline®Quelles sont vos conclusions ?

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 0%		Score moyen 2.3/5.0 (47%)	Écart-type 1.07
		Difficulté 4/13	
CHOIX DE RÉPONSES		SCORE	RÉPONSES
✓ 1. L'enfant était en crise quand il a tracé la courbe rouge		1/5	33.33% 4
✓ 2. Il existait donc un syndrome obstructif		1/5	66.67% 8
✓ 3. Par contre il n'y avait pas de syndrome restrictif		1/5	16.67% 2
4. Lors d'un syndrome obstructif la courbe est convexe		0/5	16.67% 2
✓ 5. Je conclus à un syndrome obstructif réversible		1/5	75.00% 9
✓ 6. Je rassure et envisage d'adapter la thérapeutique de fond		1/5	41.67% 5
Nombre total de participants: 12			