


Résumé du quiz

Score moyen

87% • 22/25 PTS



Statistiques

Score le plus bas	Médiane	Score le plus élevé
60%	86%	100%

Moyenne: 87%

Écart-type: 10%

Classement des questions

QUESTIONS (11)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q6 Les signes d'un bon transfert de lait après la montée de lait chez un nouveau-né à terme sont : cochez les bonnes réponses.	1	67%
Q12 L'indication de prescription de bouts de sein peut être : cochez les réponses exactes.	2	72%
Q4 Cochez les réponses vraies: l'ocytocine, hormone sécrétée par la mère	3	83%
Q13 L'usage du tire-lait peut être utile pour : cochez les bonnes réponses.	3	83%
Q9 Pour ces propositions, cochez la réponse qui vous paraît juste.	5	88%
Q10 Les repères de croissance des premiers jours, en cas d'allaitement exclusif comportent notamment : cochez les réponses exactes.	6	89%
Q3 Pour la première tétée, cochez les réponses vraies	7	100%
Q5 Les trois éléments clés pour une bonne initiation de l'allaitement maternel sont : cochez la ou les les réponse(s) vraie(s).	7	100%
Q7 Les signes qui montrent que le bébé a bien tété sont: cochez les réponses exactes.	7	100%
Q8 Pour soutenir l'allaitement maternel, le père ou le co-parent peut : cochez les bonnes réponses.	7	100%
Q11 À un mois de vie, la prise de poids attendue est de : cochez la ou les réponse(s) exacte(s).	7	100%

Q1 Prénom

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0

#	RÉPONSES	DATE
1	yazid	5/22/2025 4:30 PM
2	Gratziela	5/22/2025 4:30 PM
3	Emmanuelle	5/22/2025 4:29 PM
4	Alexis	5/22/2025 4:29 PM
5	Claudia	5/22/2025 4:26 PM
6	leila	5/22/2025 4:25 PM
7	caroline	5/22/2025 4:25 PM
8	Agathe	5/22/2025 4:25 PM
9	Marie-Emeline	5/22/2025 4:25 PM
10	elodie	5/22/2025 4:25 PM
11	Géraldine	5/22/2025 4:25 PM
12	Audrey	5/22/2025 4:24 PM


Q2 Nom

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0

#	RÉPONSES	DATE
1	cheraitia	5/22/2025 4:30 PM
2	IORGA	5/22/2025 4:30 PM
3	CLIN	5/22/2025 4:29 PM
4	Mayaud	5/22/2025 4:29 PM
5	Litzler	5/22/2025 4:26 PM
6	Plantard chekroun	5/22/2025 4:25 PM
7	laffort	5/22/2025 4:25 PM
8	Debray	5/22/2025 4:25 PM
9	Montagne	5/22/2025 4:25 PM
10	perret	5/22/2025 4:25 PM
11	Debaecker	5/22/2025 4:25 PM
12	Derouet	5/22/2025 4:24 PM

Q3 Pour la première tétée, cochez les réponses vraies

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
2.0/2.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
7/11

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Doit se faire impérativement dans les 30 premières minutes de vie	0/2	8.33% 1
Succède à l'installation du nouveau-né au sein par le soignant	0/2	25.00% 3
✓ Est le résultat d'une série d'interactions fines entre le bébé, la mère et le sein	1/2	100.00% 12
✓ Est précédée de la découverte et de la familiarisation avec le sein	1/2	100.00% 12
Nombre total de participants: 12		

Q4 Cochez les réponses vraies: l'ocytocine, hormone sécrétée par la mère

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
67%

Score moyen
2.5/3.0 (83%)

Écart-type
0.80

Difficulté
3/11

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Est sécrétée de manière continue	0/3	0.00% 0
✓ Est sécrétée de manière pulsatile	1/3	91.67% 11
✓ Favorise l'expression des comportements maternels innés	1/3	91.67% 11
✓ Sa sécrétion est influencée par l'environnement	1/3	66.67% 8
Nombre total de participants: 12		

Q5 Les trois éléments clés pour une bonne initiation de l'allaitement maternel sont : cochez la ou les les réponse(s) vraie(s).

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
7/11

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
L'expression manuelle, le peau-à-peau, les tétées à la demande	0/1	8.33% 1
Le peau-à-peau, tétée toutes les 2 heures, la cohabitation 24 h/24	0/1	0.00% 0
✓ Le peau-à-peau, première tétée dans l'heure de la naissance, la cohabitation 24 h/24	1/1	100.00% 12
L'expression manuelle, le peau-à-peau, l'allaitement instinctif	0/1	8.33% 1
Nombre total de participants: 12		

Q6 Les signes d'un bon transfert de lait après la montée de lait chez un nouveau-né à terme sont : cochez les bonnes réponses.

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
25%

Score moyen
2.0/3.0 (67%)

Écart-type
0.74

Difficulté
1/11

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ La maman ressent des contractions	1/3	50.00% 6
✓ Les seins se sont assouplis après la tétéeFaux	1/3	50.00% 6
Le bébé tète vite	0/3	8.33% 1
✓ La déglutition s'entend ou se voit au niveau du menton à chaque succion	1/3	100.00% 12
Le bébé tète toute la journée	0/3	25.00% 3
Nombre total de participants: 12		

Q7 Les signes qui montrent que le bébé a bien tété sont: cochez les réponses exactes.

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
7/11

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ ·La forme arrondie du mamelon en fin de tétée	1/1	0.00% 0
Un enfant qui dort plusieurs heures	0/1	0.00% 0
✓ Un enfant calme, détendu et repu, qui lâche le sein	1/1	100.00% 12
·Un enfant qui a des tétées espacées, car il a pris une grande quantité de lait	0/1	0.00% 0
TOTAL		12

Q8 Pour soutenir l'allaitement maternel, le père ou le co-parent peut : cochez les bonnes réponses.

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
3.0/3.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
7/11

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ S'occuper des changes et du bain du bébé	1/3	100.00%	12
·Donner des biberons de lait tiré	0/3	8.33%	1
✓ ·Encourager et soutenir la maman dans son allaitement	1/3	100.00%	12
✓ Faire du peau à peau	1/3	100.00%	12
Nombre total de participants: 12			

Q9 Pour ces propositions, cochez la réponse qui vous paraît juste.

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
75%

Score moyen
3.5/4.0 (88%)

Écart-type
1.00


Difficulté
5/11

CHOIX DE RÉPONSES

	SCORE	RÉPONSES
✓ Physiologiquement, il est attendu qu'un bébé allaité ne perde plus de poids à partir du 4e jour	1/4	83.33% 10
✓ Physiologiquement, il est attendu qu'un bébé allaité reprenne son poids de naissance à l'âge de 8 jours.	1/4	75.00% 9
Une prise de poids de 500 g à 1 mois est suffisante	0/4	0.00% 0
✓ Le suivi des urines et des selles est un bon repère à donner aux parents pour vérifier l'efficacité du transfert de lait.	1/4	100.00% 12
✓ Les 6 premières semaines, un minimum de 6 couches mouillées et 4 selles par 24 h est attendu.	1/4	91.67% 11
Il est normal qu'un nouveau-né allaité ait des selles rares, car tout est digérable dans le lait maternel	0/4	0.00% 0
Nombre total de participants: 12		

Q10 Les repères de croissance des premiers jours, en cas d'allaitement exclusif comportent notamment : cochez les réponses exactes.

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
67%

Score moyen
2.7/3.0 (89%)


Écart-type
0.49

Difficulté
6/11

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Une perte de poids de 6-9 %	1/3	100.00%	12
Une perte de poids de 10-15 %	0/3	0.00%	0
✓ Une reprise de poids à J3-J4	1/3	66.67%	8
Une reprise de poids à J7	0/3	0.00%	0
✓ Une récupération du poids de naissance entre J8 et J10	1/3	100.00%	12
Nombre total de participants: 12			

Q11 À un mois de vie, la prise de poids attendue est de : cochez la ou les réponse(s) exacte(s).

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
7/11

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
-400-500 g	0/1	0.00%	0
600-700 g	0/1	0.00%	0
✓ + de 800 g	1/1	100.00%	12
TOTAL			12

Q12 L'indication de prescription de bouts de sein peut être : cochez les réponses exactes.

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
33%

Score moyen
2.2/3.0 (72%)


Écart-type
0.72

Difficulté
2/11

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ La présence de crevasses	1/3	100.00%	12
✓ Un mamelon plat ou ombiliqué	1/3	58.33%	7
·Un frein de langue restrictif chez le bébé	0/3	8.33%	1
✓ Un bébé qui a des difficultés à maintenir le sein en bouche pour téter	1/3	58.33%	7
Un bébé hypotonique qui ne sait pas bien téter	0/3	0.00%	0
Nombre total de participants: 12			

Q13 L'usage du tire-lait peut être utile pour : cochez les bonnes réponses.

Réponses obtenues : 12 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
83%

Score moyen
0.8/1.0 (83%)

Écart-type
0.39

Difficulté
3/11

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ Stimuler la sécrétion de prolactine	1/1	0.00% 0
✓ Augmenter la lactation en cas de baisse	1/1	41.67% 5
✓ Remplacer une tétée en cas de séparation (reprise du travail, sortie de la mère...)	1/1	41.67% 5
Traiter à lui seul, un engorgement	0/1	16.67% 2
TOTAL		12