


POST TEST TTT PHARMACO du TDAH

Jeudi 18 septembre 2025

Q3: A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de méthylphénidate nécessite

Réponses obtenues : 25 Question(s) ignorée(s) : 0




Q3: A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de méthylphénidate nécessite

Réponses obtenues : 25 Question(s) ignorée(s) : 0

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Un contrôle régulier des fonctions hépatiques et rénales	0.00%	0
Un avis cardiologique préalable en cas d'antécédents de trouble du rythme ou de la conduction cardiaque	68.00%	17
Un arrêt du traitement en cas d'anorexie même limitée au repas du midi	0.00%	0
D'adapter la posologie en fonction de l'efficacité et de la tolérance	100.00%	25
Nombre total de participants: 25		

Q4: Chez un enfant ou un adolescent traité par Méthylphénidate

Réponses obtenues : 25 Question(s) ignorée(s) : 0




Q4: Chez un enfant ou un adolescent traité par Méthylphénidate

Réponses obtenues : 25 Question(s) ignorée(s) : 0

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
La survenue d'un trouble d'endormissement est rare et justifie l'arrêt du traitement	0.00%	0
La survenue de céphalées en fin de journée impose l'arrêt du traitement pour une ré évaluation plus complète de la situation	0.00%	0
La perte d'appétit quand elle est liée au traitement survient sur les quatre repas de la journée	0.00%	0
Les difficultés d'endormissement sont fréquentes et peuvent être améliorées par une supplémentation avec de la Mélatonine	100.00%	25
Nombre total de participants: 25		

Q5: La prescription du Méthylphénidate

Réponses obtenues : 25 Question(s) ignorée(s) : 0




Q5: La prescription du Méthylphénidate

Réponses obtenues : 25 Question(s) ignorée(s) : 0

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Se fait pour une durée de 28 jours, avec renouvellement autorisé jusqu'à deux fois	0.00%	0
Nécessite d'inscrire le nom de la pharmacie sur l'ordonnance	100.00%	25
Interdit de faire une ordonnance sur informatique, car elle doit être rédigée à la main et être sécurisée	0.00%	0
Nécessite d'inscrire sur l'ordonnance le nombre de lignes de prescription	76.00%	19
Nombre total de participants: 25		

Q6: Le médecin qui rédige la prescription mensuelle de méthylphénidate, après la prescription initiale

Réponses obtenues : 25 Question(s) ignorée(s) : 0




Q6: Le médecin qui rédige la prescription mensuelle de méthylphénidate, après la prescription initiale

Réponses obtenues : 25 Question(s) ignorée(s) : 0

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Peut modifier la présentation galénique	12.00%	3
Doit respecter strictement le détail et le libellé de la primo prescription.	0.00%	0
Peut modifier la dose prescrite.	96.00%	24
Peut rédiger une ordonnance avant 28 jours en mentionnant « chevauchement autorisé»	92.00%	23
Nombre total de participants: 25		

Q7: Le traitement antidépresseur médicamenteux

Réponses obtenues : 25 Question(s) ignorée(s) : 0




Q7: Le traitement antidépresseur médicamenteux

Réponses obtenues : 25 Question(s) ignorée(s) : 0

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
La fluoxétine (Prozac) a l'AMM pour les épisodes dépressifs majeurs à partir de l'âge de 8 ans	88.00%	22
La sertraline (Zoloft) a l'AMM pour les épisodes dépressifs majeurs à partir de l'âge de 6 ans (F l'AMM est pour les troubles obsessionnels compulsifs)	28.00%	7
Dans le cadre de la dépression de l'enfant et de l'adolescent, le traitement médicamenteux ne doit pas se substituer à la psychothérapie, qui est le traitement de première intention	96.00%	24
Les antidépresseurs peuvent entraîner une augmentation de l'agressivité et de l'autoagressivité	40.00%	10
Nombre total de participants: 25		

Q8: A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de neuroleptiques nécessite : (objectif 4)

Réponses obtenues : 25 Question(s) ignorée(s) : 0




Q8: A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de neuroleptiques nécessite : (objectif 4)

Réponses obtenues : 25 Question(s) ignorée(s) : 0

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Un contrôle régulier des fonctions hépatiques et rénales	28.00%	7
Un avis cardiologique préalable en cas d'antécédents de trouble du rythme ou de la conduction cardiaque.	96.00%	24
Un arrêt du traitement en cas d'anorexie même limitée au repas du midi	0.00%	0
Un contrôle régulier du bilan lipidique (HDL cholestérol, lipides totaux, triglycérides)	20.00%	5
Nombre total de participants: 25		

Q9: Les troubles d'endormissement (décalage de phase à l'endormissement)

Réponses obtenues : 25 Question(s) ignorée(s) : 0



Q9: Les troubles d'endormissement (décalage de phase à l'endormissement)

Réponses obtenues : 25 Question(s) ignorée(s) : 0

CHOIX DE RÉPONSES	RÉPONSES	
Sont fréquents dans le TDAH	100.00%	25
Sont fréquents dans les troubles du spectre de l'autisme	92.00%	23
Justifient la prescription de somnifère chez l'enfant	0.00%	0
Sont souvent améliorés par une supplémentation avec de la mélatonine	100.00%	25
Nombre total de participants: 25		