


## Quizz Pré Post test Méthylphénidate 2024

### Résumé du quiz



#### Statistiques

Score le plus bas	Médiane	Score le plus élevé
27%	64%	82%

Moyenne: 60%


Écart-type: 17%

#### Classement des questions

QUESTIONS (5)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q6 L'effet de l'atomoxétine se manifeste	1	17%
Q3 A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de méthylphénidate nécessite	2	56%
Q7 les effets secondaires de l'atomoxétine peuvent être	3	67%
Q5 En cas d'effet rebond important en fin de journée avec le méthylphénidate	4	83%
Q4 Chez un enfant ou un adolescent traité par Méthylphénidate	5	100%

## Q3 A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de méthylphénidate nécessite

Réponses obtenues : 6 Question(s) ignorée(s) : 1



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
0%

Score moyen  
1.7/3.0 (56%)

Écart-type  
0.52

Difficulté  
2/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Un contrôle régulier des fonctions hépatiques et rénales.	0/3	0.00% 0
✓ Un avis cardiologique préalable en cas d'antécédents de trouble du rythme ou de la conduction cardiaque	1/3	33.33% 2
Un arrêt du traitement en cas d'anorexie même limitée au repas du midi	0/3	0.00% 0
✓ D'adapter la posologie en fonction de l'efficacité et de la tolérance	1/3	100.00% 6
✓ De ne pas dépasser la posologie de 2 mg/kg/jour	1/3	33.33% 2
<b>Nombre total de participants: 6</b>		

## Q4 Chez un enfant ou un adolescent traité par Méthylphénidate

Réponses obtenues : 6 Question(s) ignorée(s) : 1



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
86%

Score moyen  
1.0/1.0 (100%)

Écart-type  
0.00

Difficulté  
5/5


### CHOIX DE RÉPONSES

	SCORE	RÉPONSES
La survenue d'un trouble d'endormissement est rare et justifie l'arrêt du traitement	0/1	0.00% 0
La survenue de céphalées en fin de journée impose l'arrêt du traitement pour une réévaluation plus complète de la situation	0/1	0.00% 0
La perte d'appétit quand elle est liée au traitement survient sur les quatre repas de la journée	0/1	0.00% 0
✓ Les difficultés d'endormissement sont fréquentes et peuvent être améliorées par une supplémentation par Mélatonine	1/1	100.00% 6
La supplémentation par Mélatonine exige en cas de trouble d'endormissement de recourir à la prescription d'une forme à libération retardée	0/1	0.00% 0

Nombre total de participants: 6

## Q5 En cas d'effet rebond important en fin de journée avec le méthylphénidate

Réponses obtenues : 6 Question(s) ignorée(s) : 1



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
43%

Score moyen  
2.5/3.0 (83%)


Écart-type  
0.55

Difficulté  
4/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Il faut arrêter le traitement	0/3	0.00% 0
✓ On peut changer de forme galénique	1/3	100.00% 6
✓ On peut rajouter un peu de méthylphénidate retard à midi	1/3	66.67% 4
✓ on peut rajouter un peu de méthylphénidate à effet immédiat à 17h	1/3	83.33% 5
Il faut d'emblée passer à l'atomoxétine	0/3	0.00% 0
<b>Nombre total de participants: 6</b>		

## Q6 L'effet de l'atomoxétine se manifeste

Réponses obtenues : 6 Question(s) ignorée(s) : 1



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
14%

Score moyen  
0.2/1.0 (17%)


Écart-type  
0.41

Difficulté  
1/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
immédiatement, après 2 jours	0/1	66.67%	4
après 1 semaine	0/1	16.67%	1
✓ après 3 à 6 semaines	1/1	16.67%	1
après 2 à 3 mois	0/1	0.00%	0
ne sait pas	0/1	0.00%	0
<b>Nombre total de participants: 6</b>			

## Q7 les effets secondaires de l'atomoxétine peuvent être

Réponses obtenues : 7 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
29%

Score moyen  
2.0/3.0 (67%)

Écart-type  
1.00

Difficulté  
3/5

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
une sédation trop importante	0/3	0.00%	0
✓ des nausées	1/3	57.14%	4
✓ des douleurs abdominales	1/3	85.71%	6
des troubles de l'humeur	0/3	28.57%	2
✓ des céphalées	1/3	57.14%	4
<b>Nombre total de participants: 7</b>			