
Résumé du quiz

Score moyen 83% • 11.7/14 PTS




Score le plus bas Médiane Score le plus élevé	Statistiques		
36% 86% 100%	•	·	

Moyenne: 83% Écart-type: 13%

Classement des questions

QUESTIONS (10)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q4 Un enfant TDAH peut très bien être hyperactif seulement à l'école ou seulement à la maison	1	72%
Q9 Quels sont les effets secondaires possibles du traitement par méthylphénidate	1	72%
Q8 Quel bilan paraclinique faut-il faire systématiquement avant la mise sous méthylphénidate (QCM plusieurs réponses justes possibles))	3	74%
Q6 Les troubles du spectre autistique sont souvent associés avec le TDAH	4	81%
Q7 Il est exceptionnel qu'un enfant hyperactif soit calme dans le cabinet du médecin	5	84%
Q3 Devant un enfant TDAH, il faut toujours s'assurer qu'il a des apprentissages normaux	6	93%
Q1 Il est indispensable de pratiquer un bilan neuropsychologique pour faire le diagnostic de TDAH	7	93%
Q2 les symptômes du TDAH commencent avant 12 ans	8	95%
Q10 Quelles sont les prises en charge validées du TDAH	8	95%
Q5 Il existe des formes de TDAH sans hyperactivité	10	100%


Q1 Il est indispensable de pratiquer un bilan neuropsychologique pour faire le diagnostic de **TDAH**



	OUI	✓ NON	JE NE SAIS PAS	TOTAL
POST TEST TDAH 16.10.25	0.00%	100.00% 28	0.00%	49.12% 28
Pré test TDAH 16.10.25	3.45% 1	86.21% 25	10.34%	50.88% 29
Nombre total de participants	1	53	3	57

Statistiques du quiz


Q2 les symptômes du TDAH commencent avant 12 ans



Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 95%	Score moyen 0.9/1.0 (95%)	Écart-type 0.23	Difficulté 8/10
		TE NE CAIS DAS	TOTAL

	✓ OUI	NON	JE NE SAIS PAS	TOTAL
POST TEST TDAH 16.10.25	96.43% 27	3.57% 1	0.00%	49.12% 28
Pré test TDAH 16.10.25	93.10% 27	6.90%	0.00%	50.88% 29
Nombre total de participants	54	3	0	57


Q3 Devant un enfant TDAH, il faut toujours s'assurer qu'il a des apprentissages normaux



Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 91%	Score moyen 0.9/1.0 (93%)	Écart-type 0.26	Difficulté 6/10

	✓ OUI	NON	JE NE SAIS PAS	TOTAL
POST TEST TDAH 16.10.25	96.30% 26	3.70% 1	0.00% 0	48.21% 27
Pré test TDAH 16.10.25	89.66% 26	10.34%	0.00%	51.79% 29
Nombre total de participants	52	4	0	56


Q4 Un enfant TDAH peut très bien être hyperactif seulement à l'école ou seulement à la maison



Statistiques du quiz					
Pourcentage de réponses correctes 72%		core moyen 7/1.0 (72%)	Écart-type 0.45	Difficulté 1/10	
	OUI	✓ NON	JE NE SAIS PAS	TOTAL	-
DOOT TEGT TRAIL 10 10 05	04 4007	70.570/		0.000/	40.4007

	OUI	✓ NON	JE NE SAIS PAS	TOTAL
POST TEST TDAH 16.10.25	21.43% 6	78.57% 22	0.00%	49.12% 28
Pré test TDAH 16.10.25	34.48% 10	65.52% 19	0.00%	50.88% 29
Nombre total de participants	16	41	0	57


Q5 Il existe des formes de TDAH sans hyperactivité



Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 100%	Score moyen 1.0/1.0 (100%)	Écart-type 0.00	Difficulté 10/10

	✓ OUI	NON	JE NE SAIS PAS	TOTAL
POST TEST TDAH 16.10.25	100.00% 28	0.00%	0.00%	49.12% 28
Pré test TDAH 16.10.25	100.00% 29	0.00%	0.00%	50.88% 29
Nombre total de participants	57	0	0	57


Q6 Les troubles du spectre autistique sont souvent associés avec le TDAH



Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes 81%	Score moyen 0.8/1.0 (81%)	Écart-type 0.40	Difficulté 4/10	

	✓ oui	NON	JE NE SAIS PAS	TOTAL
POST TEST TDAH 16.10.25	85.71% 24	14.29% 4	0.00%	49.12% 28
Pré test TDAH 16.10.25	75.86% 22	20.69%	3.45%	50.88% 29
Nombre total de participants	46	10	1	57


Q7 Il est exceptionnel qu'un enfant hyperactif soit calme dans le cabinet du médecin



Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes	Score moyen 0.8/1.0 (84%)	Écart-type	Difficulté
84%		0.37	5/10

	OUI	✓ NON	JE NE SAIS PAS	TOTAL
POST TEST TDAH 16.10.25	7.14% 2	92.86% 26	0.00% 0	49.12% 28
Pré test TDAH 16.10.25	24.14% 7	75.86% 22	0.00%	50.88% 29
Nombre total de participants	9	48	0	57


Q8 Quel bilan paraclinique faut-il faire systématiquement avant la mise sous méthylphénidate (QCM plusieurs réponses justes possibles))



Pourcentage de réponses correctes Score moyen Écart-type Difficulté 74% 0.7/1.0 (74%) 0.44 3/10	Statistiques du quiz		
	• .		

	✓ AUCUN DES ÉLÉMENTS CI-DESSUS	DOSAGE DE FER SANGUIN AVEC FERRITINÉMIE	NFP	CRÉATININÉMIE	EEG	ECG	TOTAL
POST TEST TDAH 16.10.25	96.43% 27	3.57% 1	3.57% 1	3.57% 1	0.00%	3.57% 1	54.39% 31
Pré test TDAH 16.10.25	51.72% 15	17.24% 5	20.69%	24.14% 7	3.45%	41.38% 12	80.70% 46
Nombre total de participants	42	6	7	8	1	13	57


Q9 Quels sont les effets secondaires possibles du traitement par méthylphénidate



Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes	Score moyen	Écart-type	Difficulté	
25%	2.9/4.0 (72%)	0.91	1/10	

	AUCUN DES ÉLÉMENTS CI- DESSUS	L'ANOREXIE	LA TOXICOMANIE À L'ÂGE ADULTE	LES TICS	✓ DES DOULEURS ABDOMINALES EN DÉBUT DE TRAITEMENT	✓ DES DIFFICULTÉS D'ENDORMISSEMENT	TOTAL
POST TEST TDAH 16.10.25	0.00%	100.00% 28	0.00%	35.71% 10	100.00% 28	96.43% 27	163.16% 93
Pré test TDAH 16.10.25	3.45%	96.55% 28	3.45%	27.59% 8	51.72% 15	68.97% 20	128.07% 73
Nombre total de participants	1	56	1	18	43	47	57

Q10 Quelles sont les prises en charge validées du TDAH



Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes	Score moyen	Écart-type	Difficulté
91%	1.9/2.0 (95%)	0.36	8/10

	LE NEUROFEED- BACK	LA REMÉDIATION NEUROPSYCHOLOGIQUE	✓ LE TRAITEMENT PAR MÉTHYLPHÉNIDATE	✓ LES GROUPES PARENTAUX TYPE GROUPES BARKLEY	TOTAL
POST TEST	7.14%	78.57%	100.00%	100.00%	140.35%
TDAH 16.10.25	2	22	28	28	80
Pré test TDAH	6.90%	58.62%	89.66%	89.66%	124.56%
16.10.25	2	17	26	26	71
Nombre total de participants	4	39	54	54	57