


Résumé du quiz

Score moyen

91% • 12.8/14 PTS



Statistiques

Score le plus bas	Médiane	Score le plus élevé
71%	93%	100%

Moyenne: 91%


Écart-type: 9%

Classement des questions

QUESTIONS (10)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q4 Un enfant TDAH peut très bien être hyperactif seulement à l'école ou seulement à la maison	1	79%
Q9 Quels sont les effets secondaires possibles du traitement par méthylphénidate	2	83%
Q6 Les troubles du spectre autistique sont souvent associés avec le TDAH	3	86%
Q7 Il est exceptionnel qu'un enfant hyperactif soit calme dans le cabinet du médecin	4	93%
Q3 Devant un enfant TDAH, il faut toujours s'assurer qu'il a des apprentissages normaux	5	96%
Q2 les symptômes du TDAH commencent avant 12 ans	6	96%
Q8 Quel bilan paraclinique faut-il faire systématiquement avant la mise sous méthylphénidate (QCM plusieurs réponses justes possibles)	6	96%
Q1 Il est indispensable de pratiquer un bilan neuropsychologique pour faire le diagnostic de TDAH	8	100%
Q5 Il existe des formes de TDAH sans hyperactivité	8	100%
Q10 Quelles sont les prises en charge validées du TDAH	8	100%

Q1 Il est indispensable de pratiquer un bilan neuropsychologique pour faire le diagnostic de TDAH

Réponses obtenues : 28 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
8/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
OUI	0/1	0.00%	0
✓ NON	1/1	100.00%	28
je ne sais pas	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 28			

Q2 les symptômes du TDAH commencent avant 12 ans

Réponses obtenues : 28 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
96%

Score moyen
1.0/1.0 (96%)


Écart-type
0.19

Difficulté
6/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ OUI	1/1	96.43%	27
NON	0/1	3.57%	1
je ne sais pas	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 28			

Q3 Devant un enfant TDAH, il faut toujours s'assurer qu'il a des apprentissages normaux

Réponses obtenues : 27 Question(s) ignorée(s) : 1



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
93%

Score moyen
1.0/1.0 (96%)


Écart-type
0.19

Difficulté
5/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ OUI	1/1	96.30%	26
NON	0/1	3.70%	1
je ne sais pas	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 27			

Q4 Un enfant TDAH peut très bien être hyperactif seulement à l'école ou seulement à la maison

Réponses obtenues : 28 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
79%

Score moyen
0.8/1.0 (79%)


Écart-type
0.42

Difficulté
1/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
oui	0/1	21.43%	6
✓ non	1/1	78.57%	22
je ne sais pas	0/1	0.00%	0
TOTAL			28

Q5 Il existe des formes de TDAH sans hyperactivité

Réponses obtenues : 28 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
8/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ OUI	1/1	100.00%	28
NON	0/1	0.00%	0
je ne sais pas	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 28			

Q6 Les troubles du spectre autistique sont souvent associés avec le TDAH

Réponses obtenues : 28 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
86%

Score moyen
0.9/1.0 (86%)


Écart-type
0.36

Difficulté
3/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ OUI	1/1	85.71%	24
NON	0/1	14.29%	4
je ne sais pas	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 28			

Q7 Il est exceptionnel qu'un enfant hyperactif soit calme dans le cabinet du médecin

Réponses obtenues : 28 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
93%

Score moyen
0.9/1.0 (93%)


Écart-type
0.26

Difficulté
4/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
OUI	0/1	7.14%	2
✓ NON	1/1	92.86%	26
je ne sais pas	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 28			

Q8 Quel bilan paraclinique faut-il faire systématiquement avant la mise sous méthylphénidate (QCM plusieurs réponses justes possibles)

Réponses obtenues : 28 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
96%

Score moyen
1.0/1.0 (96%)


Écart-type
0.19

Difficulté
6/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Aucun des éléments ci-dessus	1/1	96.43%	27
dosage de fer sanguin avec ferritinémie	0/1	3.57%	1
NFP	0/1	3.57%	1
créatininémie	0/1	3.57%	1
EEG	0/1	0.00%	0
ECG	0/1	3.57%	1
Nombre total de participants: 28			

Q9 Quels sont les effets secondaires possibles du traitement par méthylphénidate

Réponses obtenues : 28 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 36%	Score moyen 3.3/4.0 (83%)	Écart-type 0.55	Difficulté 2/10
--	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Aucun des éléments ci-dessus	0/4	0.00%	0
✓ l'anorexie	1/4	100.00%	28
la toxicomanie à l'âge adulte	0/4	0.00%	0
✓ les tics	1/4	35.71%	10
✓ des douleurs abdominales en début de traitement	1/4	100.00%	28
✓ des difficultés d'endormissement	1/4	96.43%	27
Nombre total de participants: 28			

Q10 Quelles sont les prises en charge validées du TDAH

Réponses obtenues : 28 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
2.0/2.0 (100%)

Écart-type
0.00

Difficulté
8/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
le neurofeed-back	0/2	7.14%	2
la remédiation neuropsychologique	0/2	78.57%	22
✓ le traitement par méthylphénidate	1/2	100.00%	28
✓ les groupes parentaux type groupes Barkley	1/2	100.00%	28
Nombre total de participants: 28			