
Résumé du quiz

Score moyen 79% • 10.2/13 PTS



Score le plus basMédianeScore le plus élevé46%85%92%	Statistiques	
	•	•

Moyenne: 79% Écart-type: 13%

Classement des questions

·		
QUESTIONS (11)	DIFFICULTÉ	SCORE
Q4 Le Multi test PHADIATOP® est un excellent examen de première intention chez l'enfant pour le dépistage de l'allergie respiratoire	1	36%
Q3 Les tests cutanés d'allergie sont réalisables chez l'enfant à partir de 3 ans .	2	45%
Q11 L'association corticostéroïdes inhalé/ beta 2 de longue durée d'action est contrindiquée avant 4 ans	3	68%
Q12 Un asthme est dit contrôlé chez l'enfant s'il n'a pas eu besoin que de plus d'une seule prise de bêta 2 de courte durée d'action dans la semaine précédant la consultation	4	73%
Q7 Conséquences possibles de la RA chez l'enfant ?	5	80%
Q8 La durée habituelle d'une Immunothérapie allergénique (ITA) dans la rhinite allergique est de	6	82%
Q9 L'effet préventif de ITA dans l'asthme allergique de l'enfant n'est pas démontré	7	91%
Q10 L'existence d'un allergie alimentaire chez un adolescent asthmatique est un facteur de gravité	7	91%
Q13 Le courbe débit volume est réalisable chez l'enfant à partir de 5 ans	7	91%
Q6 Quels symptômes caractéristiques de la rhinite allergique (RA)?	10	93%
Q5 Le Multi test PHADIATOP® est un excellent examen de première intention chez l'enfant pour le dépistage de l'allergie alimentaire	11	100%

Q1 Prénom

Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0

		PRÉNOM		TOTAL	
Post	t test Alleratoire Vichy		100.00% 11		50.00% 11
Pré t	test Aller asthme Vichy		100.00% 11		50.00% 11
No	ombre total de participants	22			22
#	POST TEST ALLERATOIRE VICHY			DATE	
1	Alice Espérance			11/6/2025 9:48 PM	
2	Carherine			11/6/2025 9:47 PM	
3	Julie			11/6/2025 9:45 PM	
4	Julie			11/6/2025 9:44 PM	
5	Jérémie			11/6/2025 9:44 PM	
6	Lamprini			11/6/2025 9:43 PM	
7	sandra			11/6/2025 9:43 PM	
8	jean-bernard			11/6/2025 9:42 PM	
9	Anne			11/6/2025 9:42 PM	
10	Cecile			11/6/2025 9:42 PM	
11	Fabienne			11/6/2025 9:41 PM	
#	PRÉ TEST ALLER ASTHME VICHY			DATE	
1	Fabienne			11/5/2025 9:05 PM	
2	Alice Espérance			11/4/2025 9:56 PM	
3	Jérémie			11/4/2025 3:38 PM	
4	catherine			11/4/2025 10:15 AM	
5	jean-bernard			11/3/2025 12:21 PM	
6	Anne			11/3/2025 11:11 AM	
7	Julie			10/31/2025 11:58 AM	
8	Lamprini			10/30/2025 11:29 AM	
9	Cecile			10/30/2025 10:10 AM	
10	sandra			10/30/2025 9:50 AM	

10/30/2025 9:40 AM

Julie

Q2 Nom


Réponses obtenues : 22 Question(s) ignorée(s) : 0

		NOM	TOTAL	
Post	test Alleratoire Vichy	100.00% 11		50.00% 11
Pré te	est Aller asthme Vichy	100.00% 11		50.00% 11
Noi	mbre total de participants	22		22
#	POST TEST ALLERATOIRE VICHY		DATE	
1	Sanni		11/6/2025 9:48 PM	
2	Salinier		11/6/2025 9:47 PM	
3	Sudant		11/6/2025 9:45 PM	
4	Chaix		11/6/2025 9:44 PM	
5	Bled		11/6/2025 9:44 PM	
6	Vogiatzi		11/6/2025 9:43 PM	
7	brancato		11/6/2025 9:43 PM	
8	pierre-jean		11/6/2025 9:42 PM	
9	Chevé		11/6/2025 9:42 PM	
10	Kerdudo-Veau		11/6/2025 9:42 PM	
11	Kochert		11/6/2025 9:41 PM	
#	PRÉ TEST ALLER ASTHME VICHY		DATE	
1	Kochert		11/5/2025 9:05 PM	
2	Sanni		11/4/2025 9:56 PM	
3	Bled		11/4/2025 3:38 PM	
4	SALINIER		11/4/2025 10:15 AM	
5	pierre-jean		11/3/2025 12:21 PM	
6	CHEVÉ		11/3/2025 11:11 AM	
7	Chaix		10/31/2025 11:58 AN	Л
8	Vogiatzi		10/30/2025 11:29 AN	Л
9	Kerdudo-Veau		10/30/2025 10:10 AN	Л
10	brancato		10/30/2025 9:50 AM	

10/30/2025 9:40 AM

Sudant

Q3 Les tests cutanés d'allergie sont réalisables chez l'enfant à partir de 3 ans .



	Vrai	Faux					
Statistiques du quiz							
Pourcentage de réponses correctes 45%		Score moyen 0.5/1.0 (45%)		Écart-type 0.51		Difficulté 2/11	
		VRAI		✓ FAUX		TOTAL	
Post test Alleratoire Vichy			54.55% 6		45.45% 5		50.00% 11
Pré test Aller asthme Vichy			54.55%		45.45%		50.00%

12

10

Nombre total de participants


11

4	/	14
	,	


Q4 Le Multi test PHADIATOP® est un excellent examen de première intention chez l'enfant pour le dépistage de l'allergie respiratoire



Q5 Le Multi test PHADIATOP® est un excellent examen de première intention chez l'enfant pour le dépistage de l'allergie alimentaire




Q6 Quels symptômes caractéristiques de la rhinite allergique (RA)?






	✓ ETERNUMENTS EN SALVES	RHINORRHÉE ÉPAISSE	URTICAIRE PÉRI NASAL	✓ PRURIT DU PALAIS ET DE LA GORGE	TOTAL
Post test Alleratoire Vichy	100.00%	18.18%	45.45%	100.00%	131.82%
	11	2	5	11	29
Pré test Aller asthme	100.00%	18.18%	27.27%	72.73%	109.09%
Vichy	11	2	3	8	24
Nombre total de participants	22	4	8	19	22

Q7 Conséquences possibles de la RA chez l'enfant ?






	✓ HYPERACTIVITÉ	✓ DÉFORMATIONS DU MASSIF FACIAL	HYPERSOMNIE	TOTAL
Post test Alleratoire Vichy	81.82%	81.82%	36.36%	100.00%
	9	9	4	22
Pré test Aller asthme Vichy	81.82%	72.73%	54.55%	104.55%
	9	8	6	23
Nombre total de participants	18	17	10	22

Q8 La durée habituelle d'une Immunothérapie allergénique (ITA) dans la rhinite allergique est de



Q9 L'effet préventif de ITA dans l'asthme allergique de l'enfant n'est pas démontré



V	rai Faux		
Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 91%	Score moyen 0.9/1.0 (91%)	Écart-type 0.29	Difficulté 7/11
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL
Post test Alleratoire Vichy	0.	00% 100.00% 0 11	50.00% 11
Pré test Aller asthme Vichy	18.	18% 81.82%	50.00%

Nombre total de participants

2

20


9

11

Q10 L'existence d'un allergie alimentaire chez un adolescent asthmatique est un facteur de gravité



Q11 L'association corticostéroïdes inhalé/ beta 2 de longue durée d'action est contrindiquée avant 4 ans




Pourcentage de réponses correctes	Score moyen	Écart-type	Difficulté
68%	0.7/1.0 (68%)	0.48	3/11
	✓ VRAI	FAUX	TOTAL
Post test Alleratoire Vichy	81.82%	18.18%	50.00%
	9	2	11
Pré test Aller asthme Vichy	54.55%	45.45%	50.00%
	6	5	11
Nombre total de participants	15	7	22

Statistiques du quiz

Q12 Un asthme est dit contrôlé chez l'enfant s'il n'a pas eu besoin que de plus d'une seule prise de bêta 2 de courte durée d'action dans la semaine précédant la consultation



Q13 Le courbe débit volume est réalisable chez l'enfant à partir de 5 ans



	Vrai	Faux					
Statistiques du quiz							
Pourcentage de réponses correctes 91%		Score moyen 0.9/1.0 (91%)		Écart-type 0.29		Difficulté 7/11	
		✓ VRAI		FAUX		TOTAL	
Post test Alleratoire Vichy			100.00%		0.00%		50.00%
			11		0		11
Pré test Aller asthme Vichy			81.82%		18.18%		50.00%
			9		2		11

20

2

22

Nombre total de participants