


Résumé du quiz

Score moyen
83% • 10.7/13 PTS



Statistiques

Score le plus bas	Médiane	Score le plus élevé
62%	85%	92%

Moyenne: 83%

Écart-type: 10%

Classement des questions

QUESTIONS (11)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q4 Le Multi test PHADIATOP® est un excellent examen de première intention chez l'enfant pour le dépistage de l'allergie respiratoire	1	36%
Q3 Les tests cutanés d'allergie sont réalisables chez l'enfant à partir de 3 ans .	2	45%
Q12 Un asthme est dit contrôlé chez l'enfant s'il n'a pas eu besoin que de plus d'une seule prise de bêta 2 de courte durée d'action dans la semaine précédant la consultation	3	64%
Q7 Conséquences possibles de la RA chez l'enfant ?	4	82%
Q8 La durée habituelle d'une Immunothérapie allergénique (ITA) dans la rhinite allergique est de	4	82%
Q11 L'association corticostéroïdes inhalé/ beta 2 de longue durée d'action est contrindiquée avant 4 ans	4	82%
Q5 Le Multi test PHADIATOP® est un excellent examen de première intention chez l'enfant pour le dépistage de l'allergie alimentaire	7	100%
Q6 Quels symptômes caractéristiques de la rhinite allergique (RA)?	7	100%
Q9 L'effet préventif de ITA dans l'asthme allergique de l'enfant n'est pas démontré	7	100%
Q10 L'existence d'un allergie alimentaire chez un adolescent asthmatique est un facteur de gravité	7	100%
Q13 Le courbe débit volume est réalisable chez l'enfant à partir de 5 ans	7	100%

Q1 Prénom

Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 0

#	RÉPONSES	DATE
1	Alice Espérance	11/6/2025 9:48 PM
2	Carherine	11/6/2025 9:47 PM
3	Julie	11/6/2025 9:45 PM
4	Julie	11/6/2025 9:44 PM
5	Jérémie	11/6/2025 9:44 PM
6	Lamprini	11/6/2025 9:43 PM
7	sandra	11/6/2025 9:43 PM
8	jean-bernard	11/6/2025 9:42 PM
9	Anne	11/6/2025 9:42 PM
10	Cecile	11/6/2025 9:42 PM
11	Fabienne	11/6/2025 9:41 PM


Q2 Nom

Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 0

#	RÉPONSES	DATE
1	Sanni	11/6/2025 9:48 PM
2	Salinier	11/6/2025 9:47 PM
3	Sudant	11/6/2025 9:45 PM
4	Chaix	11/6/2025 9:44 PM
5	Bled	11/6/2025 9:44 PM
6	Vogiatzi	11/6/2025 9:43 PM
7	brancato	11/6/2025 9:43 PM
8	pierre-jean	11/6/2025 9:42 PM
9	Chevé	11/6/2025 9:42 PM
10	Kerdudo-Veau	11/6/2025 9:42 PM
11	Kochert	11/6/2025 9:41 PM

Q3 Les tests cutanés d'allergie sont réalisables chez l'enfant à partir de 3 ans .

Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
45%

Score moyen
0.5/1.0 (45%)


Écart-type
0.52

Difficulté
2/11

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	54.55%	6
✓ Faux	1/1	45.45%	5
TOTAL			11

Q4 Le Multi test PHADIATOP® est un excellent examen de première intention chez l'enfant pour le dépistage de l'allergie respiratoire

Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
36%

Score moyen
0.4/1.0 (36%)


Écart-type
0.50

Difficulté
1/11

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	63.64%	7
✓ Faux	1/1	36.36%	4
TOTAL			11

Q5 Le Multi test PHADIATOP® est un excellent examen de première intention chez l'enfant pour le dépistage de l'allergie alimentaire

Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
7/11

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	0.00%	0
✓ Faux	1/1	100.00%	11
TOTAL			11

Q6 Quels symptômes caractéristiques de la rhinite allergique (RA)?

Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%Score moyen
2.0/2.0 (100%)Écart-type
0.00Difficulté
7/11

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Eternuments en salves	1/2	100.00%	11
Rhinorrhée épaisse	0/2	18.18%	2
Urticaire péri nasal	0/2	45.45%	5
✓ Prurit du palais et de la gorge	1/2	100.00%	11
Nombre total de participants: 11			

Q7 Conséquences possibles de la RA chez l'enfant ?

Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
64%

Score moyen
1.6/2.0 (82%)


Écart-type
0.50

Difficulté
4/11

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Hyperactivité	1/2	81.82%	9
✓ Déformations du massif facial	1/2	81.82%	9
Hypersomnie	0/2	36.36%	4
Nombre total de participants: 11			

Q8 La durée habituelle d'une Immunothérapie allergénique (ITA) dans la rhinite allergique est de

Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
82%

Score moyen
0.8/1.0 (82%)


Écart-type
0.40

Difficulté
4/11

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Un an	0/1	9.09%	1
✓ Trois ans	1/1	81.82%	9
Cinq ans	0/1	9.09%	1
TOTAL			11

Q9 L'effet préventif de ITA dans l'asthme allergique de l'enfant n'est pas démontré

Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
7/11

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	0.00%	0
✓ Faux	1/1	100.00%	11
TOTAL			11

Q10 L'existence d'une allergie alimentaire chez un adolescent asthmatique est un facteur de gravité

Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
7/11

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	100.00%	11
Faux	0/1	0.00%	0
TOTAL			11

Q11 L'association corticostéroïdes inhalé/ beta 2 de longue durée d'action est contrindiquée avant 4 ans

Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
82%

Score moyen
0.8/1.0 (82%)


Écart-type
0.40

Difficulté
4/11

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	81.82%	9
Faux	0/1	18.18%	2
TOTAL			11

Q12 Un asthme est dit contrôlé chez l'enfant s'il n'a pas eu besoin que de plus d'une seule prise de bêta 2 de courte durée d'action dans la semaine précédant la consultation

Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
64%

Score moyen
0.6/1.0 (64%)


Écart-type
0.50

Difficulté
3/11

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	36.36%	4
✓ Faux	1/1	63.64%	7
TOTAL			11

Q13 Le courbe débit volume est réalisable chez l'enfant à partir de 5 ans

Réponses obtenues : 11 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%Score moyen
1.0/1.0 (100%)Écart-type
0.00Difficulté
7/11

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	100.00%	11
Faux	0/1	0.00%	0
TOTAL			11