


Résumé du quiz



Statistiques

Score le plus bas
44%

Médiane
81%

Score le plus élevé
100%

Moyenne: 81%

Écart-type: 11%

Classement des questions

QUESTIONS (7)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q8 A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de neuroleptiques nécessite : (objectif 4)	1	53%
Q7 Le traitement antidépresseur médicamenteux	2	67%
Q6 Le médecin qui rédige la prescription mensuelle de méthylphénidate, après la prescription initiale	3	88%
Q3 A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de méthylphénidate nécessite	4	89%
Q5 La prescription du Méthylphénidate	5	94%
Q4 Chez un enfant ou un adolescent traité par Méthylphénidate	6	96%
Q9 Les troubles d'endormissement (décalage de phase à l'endormissement)	7	98%

Q1 NOM

Réponses obtenues : 48 Question(s) ignorée(s) : 0

	NOM	TOTAL
pre test TTT p...TDAH 18.11.25	100.00% 24	50.00% 24
POST TEST TTT ...AH 18.11.2025	100.00% 24	50.00% 24
Nombre total de participants	48	48


Q2 PRENOM

Réponses obtenues : 48 Question(s) ignorée(s) : 0

	PRENOM	TOTAL
pre test TTT p...TDAH 18.11.25	100.00% 24	50.00% 24
POST TEST TTT ...AH 18.11.2025	100.00% 24	50.00% 24
Nombre total de participants	48	48

Q3 A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de méthylphénidate nécessite

Réponses obtenues : 48 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
77%Score moyen
1.8/2.0 (89%)Écart-type
0.42Difficulté
4/7

	UN CONTRÔLE RÉGULIER DES FONCTIONS HÉPATIQUES ET RÉNALES	✓ UN AVIS CARDIOLOGIQUE PRÉALABLE EN CAS D'ANTÉCÉDENTS DE TROUBLE DU RYTHME OU DE LA CONDUCTION CARDIAQUE	UN ARRÊT DU TRAITEMENT EN CAS D'ANOREXIE MÊME LIMITÉE AU REPAS DU MIDI	✓ D'ADAPTER LA POSOLOGIE EN FONCTION DE L'EFFICACITÉ ET DE LA TOLÉRANCE	TOTAL
pre test TTT p...TDAH 18.11.25	4.17% 1	83.33% 20	0.00% 0	100.00% 24	93.75% 45
POST TEST TTT ...AH 18.11.2025	0.00% 0	70.83% 17	0.00% 0	100.00% 24	85.42% 41
Nombre total de participants	1	37	0	48	48

Q4 Chez un enfant ou un adolescent traité par Méthylphénidate

Réponses obtenues : 48 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes	Score moyen	Écart-type	Difficulté
96%	1.0/1.0 (96%)	0.20	6/7

	LA SURVENUE D'UN TROUBLE D'ENDORMISSEMENT EST RARE ET JUSTIFIE L'ARRÊT DU TRAITEMENT	LA SURVENUE DE CÉPHALÉES EN FIN DE JOURNÉE IMPOSE L'ARRÊT DU TRAITEMENT POUR UNE RÉ ÉVALUATION PLUS COMPLÈTE DE LA SITUATION	LA PERTE D'APPÉTIT QUAND ELLE EST LIÉE AU TRAITEMENT SURVIENT SUR LES QUATRE REPAS DE LA JOURNÉE	✓ LES DIFFICULTÉS D'ENDORMISSEMENT SONT FRÉQUENTES ET PEUVENT ÊTRE AMÉLIORÉES PAR UNE SUPPLÉMENTATION AVEC DE LA MÉLATONINE	TOTAL
pre test TTT p...TDAH 18.11.25	8.33% 2	4.17% 1	0.00% 0	91.67% 22	52.08% 25
POST TEST TTT ...AH 18.11.2025	0.00% 0	0.00% 0	0.00% 0	100.00% 24	50.00% 24
Nombre total de participants	2	1	0	46	48

Q5 La prescription du Méthylphénidate


Réponses obtenues : 48 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz					
Pourcentage de réponses correctes		Score moyen		Écart-type	Difficulté
90%		1.9/2.0 (94%)		0.39	5/7
	SE FAIT POUR UNE DURÉE DE 28 JOURS, AVEC RENOUVELLEMENT AUTORISÉ JUSQU'À DEUX FOIS	✓ NÉCESSITE D'INSCRIRE LE NOM DE LA PHARMACIE SUR L'ORDONNANCE	INTERDIT DE FAIRE UNE ORDONNANCE SUR INFORMATIQUE, CAR ELLE DOIT ÊTRE RÉDIGÉE À LA MAIN ET ÊTRE SÉCURISÉE	✓ NÉCESSITE D'INSCRIRE SUR L'ORDONNANCE LE NOMBRE DE LIGNES DE PRESCRIPTION	TOTAL
pre test TTT p...TDAH 18.11.25	8.33% 2	95.83% 23	8.33% 2	79.17% 19	95.83% 46
POST TEST TTT ...AH 18.11.2025	0.00% 0	100.00% 24	0.00% 0	100.00% 24	100.00% 48
Nombre total de participants	2	47	2	43	48

Q6 Le médecin qui rédige la prescription mensuelle de méthylphénidate, après la prescription initiale

Réponses obtenues : 48 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
79%

Score moyen
1.8/2.0 (88%)


Écart-type
0.53

Difficulté
3/7

	PEUT MODIFIER LA PRÉSENTATION GALÉNIQUE	DOIT RESPECTER STRICTEMENT LE DÉTAIL ET LE LIBELLÉ DE LA PRIMO PRESCRIPTION.	✓ PEUT MODIFIER LA DOSE PRESCRITE.	✓ PEUT RÉDIGER UNE ORDONNANCE AVANT 28 JOURS EN MENTIONNANT « CHEVAUCHEMENT AUTORISÉ»	TOTAL
pre test TTT p...TDAH 18.11.25	58.33% 14	20.83% 5	75.00% 18	83.33% 20	118.75% 57
POST TEST TTT ...AH 18.11.2025	29.17% 7	4.17% 1	100.00% 24	91.67% 22	112.50% 54
Nombre total de participants	21	6	42	42	48

Q7 Le traitement antidépresseur médicamenteux

Réponses obtenues : 48 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
21%Score moyen
2.0/3.0 (67%)Écart-type
0.65Difficulté
2/7

	✓ LA FLUOXÉTINE (PROZAC) A L'AMM POUR LES ÉPISODES DÉPRESSIFS MAJEURS À PARTIR DE L'ÂGE DE 8 ANS	LA SERTRALINE (ZOLOFT) A L'AMM POUR LES ÉPISODES DÉPRESSIFS MAJEURS À PARTIR DE L'ÂGE DE 6 ANS (F L'AMM EST POUR LES TROUBLES OBSESSIONNELS COMPULSIFS)	✓ DANS LE CADRE DE LA DÉPRESSION DE L'ENFANT ET DE L'ADOLESCENT, LE TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX NE DOIT PAS SE SUBSTITUER À LA PSYCHOTHÉRAPIE, QUI EST LE TRAITEMENT DE PREMIÈRE INTENTION	✓ LES ANTIDÉPRESSEURS PEUVENT ENTRAINER UNE AUGMENTATION DE L'AGRESSIVITÉ ET DE L'AUTOAGRESSIVITÉ	TOTAL
pre test TTT p...TDAH 18.11.25	16.67% 4	25.00% 6	100.00% 24	54.17% 13	97.92% 47
POST TEST TTT ...AH 18.11.2025	91.67% 22	25.00% 6	95.83% 23	41.67% 10	127.08% 61
Nombre total de participants	26	12	47	23	48

Q8 A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de neuroleptiques nécessite : (objectif 4)

Réponses obtenues : 48 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
19%

Score moyen
1.6/3.0 (53%)


Écart-type
0.84

Difficulté
1/7

	✓ UN CONTRÔLE RÉGULIER DES FONCTIONS HÉPATIQUES ET RÉNALES	✓ UN AVIS CARDIOLOGIQUE PRÉALABLE EN CAS D'ANTÉCÉDENTS DE TROUBLE DU RYTHME OU DE LA CONDUCTION CARDIAQUE.	UN ARRÊT DU TRAITEMENT EN CAS D'ANOREXIE MÊME LIMITÉE AU REPAS DU MIDI	✓ UN CONTRÔLE RÉGULIER DU BILAN LIPIDIQUE (HDL CHOLESTÉROL, LIPIDES TOTAUX, TRIGLYCÉRIDES)	TOTAL
pre test TTT p...TDAH 18.11.25	54.17% 13	45.83% 11	8.33% 2	50.00% 12	79.17% 38
POST TEST TTT ...AH 18.11.2025	29.17% 7	95.83% 23	0.00% 0	45.83% 11	85.42% 41
Nombre total de participants	20	34	2	23	48

Q9 Les troubles d'endormissement (décalage de phase à l'endormissement)

Réponses obtenues : 48 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz					
Pourcentage de réponses correctes		Score moyen		Écart-type	Difficulté
94%		2.9/3.0 (98%)		0.24	7/7
	✓ SONT FRÉQUENTS DANS LE TDAH	✓ SONT FRÉQUENTS DANS LES TROUBLES DU SPECTRE DE L'AUTISME	JUSTIFIENT LA PRESCRIPTION DE SOMNIFÈRE CHEZ L'ENFANT	✓ SONT SOUVENT AMÉLIORÉS PAR UNE SUPPLÉMENTATION AVEC DE LA MÉLATONINE	TOTAL
pre test TTT p...TDAH 18.11.25	100.00% 24	91.67% 22	4.17% 1	100.00% 24	147.92% 71
POST TEST TTT ...AH 18.11.2025	100.00% 24	95.83% 23	0.00% 0	100.00% 24	147.92% 71
Nombre total de participants	48	45	1	48	48