


Résumé du quiz



Statistiques

Score le plus bas	Médiane	Score le plus élevé
75%	88%	100%

Moyenne: 85%

Écart-type: 7%

Classement des questions

QUESTIONS (7)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q8 A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de neuroleptiques nécessite : (objectif 4)	1	57%
Q7 Le traitement antidépresseur médicamenteux	2	76%
Q3 A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de méthylphénidate nécessite	3	85%
Q6 Le médecin qui rédige la prescription mensuelle de méthylphénidate, après la prescription initiale	4	96%
Q9 Les troubles d'endormissement (décalage de phase à l'endormissement)	5	99%
Q4 Chez un enfant ou un adolescent traité par Méthylphénidate	6	100%
Q5 La prescription du Méthylphénidate	6	100%

Q1 NOM


Réponses obtenues : 24 Question(s) ignorée(s) : 0

Q2 PRENOM

Réponses obtenues : 24 Question(s) ignorée(s) : 0

Q3 A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de méthylphénidate nécessite

Réponses obtenues : 24 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
71%

Score moyen
1.7/2.0 (85%)


Écart-type
0.46

Difficulté
3/7

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Un contrôle régulier des fonctions hépatiques et rénales	0/2	0.00% 0
✓ Un avis cardiologique préalable en cas d'antécédents de trouble du rythme ou de la conduction cardiaque	1/2	70.83% 17
Un arrêt du traitement en cas d'anorexie même limitée au repas du midi	0/2	0.00% 0
✓ D'adapter la posologie en fonction de l'efficacité et de la tolérance	1/2	100.00% 24
Nombre total de participants: 24		

Q4 Chez un enfant ou un adolescent traité par Méthylphénidate

Réponses obtenues : 24 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
6/7

CHOIX DE RÉPONSES		SCORE	RÉPONSES
La survenue d'un trouble d'endormissement est rare et justifie l'arrêt du traitement		0/1	0.00% 0
La survenue de céphalées en fin de journée impose l'arrêt du traitement pour une ré évaluation plus complète de la situation		0/1	0.00% 0
La perte d'appétit quand elle est liée au traitement survient sur les quatre repas de la journée		0/1	0.00% 0
✓	Les difficultés d'endormissement sont fréquentes et peuvent être améliorées par une supplémentation avec de la Mélatonine	1/1	100.00% 24
Nombre total de participants: 24			

Q5 La prescription du Méthylphénidate

Réponses obtenues : 24 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
2.0/2.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
6/7

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Se fait pour une durée de 28 jours, avec renouvellement autorisé jusqu'à deux fois	0/2	0.00% 0
✓ Nécessite d'inscrire le nom de la pharmacie sur l'ordonnance	1/2	100.00% 24
Interdit de faire une ordonnance sur informatique, car elle doit être rédigée à la main et être sécurisée	0/2	0.00% 0
✓ Nécessite d'inscrire sur l'ordonnance le nombre de lignes de prescription	1/2	100.00% 24
Nombre total de participants: 24		

Q6 Le médecin qui rédige la prescription mensuelle de méthylphénidate, après la prescription initiale

Réponses obtenues : 24 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
92%

Score moyen
1.9/2.0 (96%)


Écart-type
0.28

Difficulté
4/7

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Peut modifier la présentation galénique	0/2	29.17% 7
Doit respecter strictement le détail et le libellé de la primo prescription.	0/2	4.17% 1
✓ Peut modifier la dose prescrite.	1/2	100.00% 24
✓ Peut rédiger une ordonnance avant 28 jours en mentionnant « chevauchement autorisé »	1/2	91.67% 22
Nombre total de participants: 24		

Q7 Le traitement antidépresseur médicamenteux

Réponses obtenues : 24 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
33%

Score moyen
2.3/3.0 (76%)


Écart-type
0.55

Difficulté
2/7

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ La fluoxétine (Prozac) a l'AMM pour les épisodes dépressifs majeurs à partir de l'âge de 8 ans	1/3	91.67% 22
La sertraline (Zoloft) a l'AMM pour les épisodes dépressifs majeurs à partir de l'âge de 6 ans (F l'AMM est pour les troubles obsessionnels compulsifs)	0/3	25.00% 6
✓ Dans le cadre de la dépression de l'enfant et de l'adolescent, le traitement médicamenteux ne doit pas se substituer à la psychothérapie, qui est le traitement de première intention	1/3	95.83% 23
✓ Les antidépresseurs peuvent entraîner une augmentation de l'agressivité et de l'autoagressivité	1/3	41.67% 10
Nombre total de participants: 24		

Q8 A cause des effets secondaires potentiels, la prescription de neuroleptiques nécessite : (objectif 4)

Réponses obtenues : 24 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
29%

Score moyen
1.7/3.0 (57%)


Écart-type
0.91

Difficulté
1/7

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ Un contrôle régulier des fonctions hépatiques et rénales	1/3	29.17% 7
✓ Un avis cardiologique préalable en cas d'antécédents de trouble du rythme ou de la conduction cardiaque.	1/3	95.83% 23
Un arrêt du traitement en cas d'anorexie même limitée au repas du midi	0/3	0.00% 0
✓ Un contrôle régulier du bilan lipidique (HDL cholestérol, lipides totaux, triglycérides)	1/3	45.83% 11
Nombre total de participants: 24		

Q9 Les troubles d'endormissement (décalage de phase à l'endormissement)

Réponses obtenues : 24 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
96%

Score moyen
3.0/3.0 (99%)

Écart-type
0.20

Difficulté
5/7

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ Sont fréquents dans le TDAH	1/3	100.00% 24
✓ Sont fréquents dans les troubles du spectre de l'autisme	1/3	95.83% 23
Justifient la prescription de somnifère chez l'enfant	0/3	0.00% 0
✓ Sont souvent améliorés par une supplémentation avec de la mélatonine	1/3	100.00% 24
Nombre total de participants: 24		