


Résumé du quiz

Score moyen
74% • 8.1/11 PTS



Statistiques

Score le plus bas	Médiane	Score le plus élevé
27%	73%	100%

Moyenne: 74%

Écart-type: 15%

Classement des questions

QUESTIONS (10)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q5 Pointer pour demander un paquet de bonbons s'appelle le pointage protodéclaratif	1	50%
Q4 le test MCHAT peut se pratiquer jusqu'à 6 ans	2	57%
Q7 le déficit intellectuel est très fréquent dans les TSA (environ 80% des cas)	3	67%
Q8 le médecin traitant ne doit pas annoncer le diagnostic de TSA aux parents; c'est le rôle des centres de référence	4	70%
Q10 le grand enfant porteur d'un TSA a peu de compassion pour autrui	4	70%
Q9 le grand enfant porteur d'un TSA a un grand sens de l'humour	6	73%
Q3 tout retard de langage à 24 mois doit faire évoquer un TSA	7	77%
Q12 Quelles sont les thérapeutiques possibles et efficaces du TSA (plusieurs choix possibles)	8	80%
Q6 les troubles sensoriels sont un élément important autant pour le diagnostic que pour la prise en charge	9	93%
Q11 le diagnostic de TSA exclut celui de trouble déficitaire de l'attention et donc contre-indique l'utilisation du méthylphénidate	9	93%

Q1 Prénom


Réponses obtenues : 30 Question(s) ignorée(s) : 0

Q2 Nom

Réponses obtenues : 30 Question(s) ignorée(s) : 0

Q3 tout retard de langage à 24 mois doit faire évoquer un TSA

Réponses obtenues : 30 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
77%

Score moyen
0.8/1.0 (77%)


Écart-type
0.43

Difficulté
7/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ oui	1/1	76.67% 23
non	0/1	26.67% 8
ne sait pas	0/1	0.00% 0
La présence des parents est souhaitable, mais si l'enfant ne s'exprime pas, on peut leur demander de sortir	0/1	0.00% 0
Il faut une consultation dédiée, dans le cadre de l'examen systématique de 4 ans	0/1	0.00% 0
Nombre total de participants: 30		

Q4 le test MCHAT peut se pratiquer jusqu'à 6 ans

Réponses obtenues : 30 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
57%

Score moyen
0.6/1.0 (57%)


Écart-type
0.50

Difficulté
2/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
oui	0/1	20.00%	6
✓ non	1/1	56.67%	17
ne sait pas	0/1	23.33%	7
Fait partie des indicateurs donnant des points pour le ROSP	0/1	0.00%	0
Est à priori toujours perturbé en cas de bilinguisme	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 30			

Q5 Pointer pour demander un paquet de bonbons s'appelle le pointage protodéclaratif

Réponses obtenues : 30 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
50%

Score moyen
0.5/1.0 (50%)


Écart-type
0.51

Difficulté
1/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
oui	0/1	46.67%	14
✓ non	1/1	50.00%	15
ne sait pas	0/1	3.33%	1
Le trouble développemental du langage (anciennement appelé dysphasie).	0/1	0.00%	0
Le bilinguisme	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 30			

Q6 les troubles sensoriels sont un élément important autant pour le diagnostic que pour la prise en charge

Réponses obtenues : 30 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
93%

Score moyen
0.9/1.0 (93%)


Écart-type
0.25

Difficulté
9/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ oui	1/1	93.33%	28
dessiner un bonhomme avec un tronc	0/1	0.00%	0
non	0/1	6.67%	2
ne sait pas	0/1	0.00%	0
construire un pont de 5 cubes	0/1	0.00%	0
compter jusqu'à quatre objets	0/1	0.00%	0
désigner une couleur primaire qu'on lui	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 30			

Q7 le déficit intellectuel est très fréquent dans les TSA (environ 80% des cas)

Réponses obtenues : 30 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
67%

Score moyen
0.7/1.0 (67%)


Écart-type
0.48

Difficulté
3/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
oui	0/1	6.67%	2
✓ non	1/1	66.67%	20
ne sait pas	0/1	26.67%	8
TOTAL			30

Q8 le médecin traitant ne doit pas annoncer le diagnostic de TSA aux parents; c'est le rôle des centres de référence

Réponses obtenues : 30 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
70%

Score moyen
0.7/1.0 (70%)


Écart-type
0.47

Difficulté
4/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
vrai	0/1	20.00%	6
✓ faux	1/1	70.00%	21
ne sait pas	0/1	10.00%	3
TOTAL			30

Q9 le grand enfant porteur d'un TSA a un grand sens de l'humour

Réponses obtenues : 30 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
73%Score moyen
0.7/1.0 (73%)Écart-type
0.45Difficulté
6/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
VRAI	0/1	13.33%	4
✓ FAUX	1/1	73.33%	22
ne sait pas	0/1	13.33%	4
TOTAL			30

Q10 le grand enfant porteur d'un TSA a peu de compassion pour autrui

Réponses obtenues : 30 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
70%Score moyen
0.7/1.0 (70%)Écart-type
0.47Difficulté
4/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ VRAI	1/1	70.00%	21
FAUX	0/1	16.67%	5
ne sait pas	0/1	13.33%	4
muet	0/1	0.00%	0
muet	0/1	0.00%	0
Nombre total de participants: 30			

Q11 le diagnostic de TSA exclut celui de trouble déficitaire de l'attention et donc contre-indique l'utilisation du méthylphénidate

Réponses obtenues : 30 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
93%

Score moyen
0.9/1.0 (93%)


Écart-type
0.25

Difficulté
9/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
VRAI	0/1	3.33%	1
✓ FAUX	1/1	93.33%	28
ne sait pas	0/1	3.33%	1
céphalées	0/1	0.00%	0
difficultés d'endormissement	0/1	0.00%	0
TOTAL			30

Q12 Quelles sont les thérapies possibles et efficaces du TSA (plusieurs choix possibles)

Réponses obtenues : 30 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
60%

Score moyen
1.6/2.0 (80%)

Écart-type
0.50

Difficulté
8/10

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ la méthode ABA	1/2	60.00%	18
la psychanalyse	0/2	13.33%	4
✓ les groupes d'habileté sociale	1/2	100.00%	30
le régime sans gluten	0/2	3.33%	1
Nombre total de participants: 30			