


## Résumé du quiz

Score moyen



## Statistiques

Score le plus bas	Médiane	Score le plus élevé
47%	80%	100%
Moyenne: 80%		
Écart-type: 18%		

## Classement des questions

QUESTIONS (15)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
<b>Q7</b> Le questionnaire M-CHAT est un questionnaire spécifique pour le dépistage des Troubles du Spectre Autistique (TSA) validé de 9 mois à 3 ans.	1	45%
<b>Q16</b> A 2 et 3 ans les critères d'adressage à la PCO sont 3 signes d'alerte dans 2 domaines différents (socialisation, langage, motricité fine, motricité globale).	2	50%
<b>Q3</b> Une surdité congénitale unilatérale de perception ne gêne pas l'acquisition du langage.	3	65%
<b>Q5</b> Les otites séreuses sont causes de surdité de perception.	4	70%
<b>Q8</b> A 2 ans l'enfant doit connaître 3 couleurs.	5	75%
<b>Q12</b> L'asymétrie de préhension d'un bâton est normale à 9 mois, âge de début de la latéralisation.	5	75%
<b>Q10</b> L'hypermétropie est un trouble de réfraction en rapport avec un œil anatomiquement trop long.	7	80%
<b>Q13</b> A 2 ans l'enfant doit reproduire un pont de 3 cubes et une tour de 8 cubes.	7	80%
<b>Q6</b> A 3 ans un bégaiement ou un langage jargon justifient une prise en charge orthophonique.	9	90%
<b>Q9</b> Sachant qu'une acuité visuelle de 6/10 est normale à 3 ans, une acuité visuelle à 8/10 œil droit et 6/10 œil gauche justifie une consultation OPH.	9	90%
<b>Q14</b> A 3 ans l'enfant reproduit un rond bien fermé avec une prise de crayon pouce-index.	9	90%
<b>Q11</b> Les lunettes à secteurs et les lunettes à écran sont toutes les deux utilisées pour le dépistage de l'ambylopie et du strabisme.	12	95%
<b>Q15</b> Les plateformes de coordination et d'orientation (PCO) ont pour mission la prise en charge exclusive des troubles du spectre autistique (TSA).	12	95%
<b>Q17</b> La consultation « trouble de l'enfant » (CTE) valorisée à 60 euros, initialement dédiée aux TSA, a été étendue au dépistage des Troubles du Neurodéveloppement (TND) pour les pédiatres et généralistes.	12	95%
<b>Q4</b> Un dépistage auditif normal en période néonatale par otoémission acoustique ou potentiel évoqué auditif garantit l'absence de surdité de perception à 3 ans.	15	100%

**Q1 Prénom**

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0

	PRÉNOM	TOTAL
PRE TEST EXAME... 36 MOIS 2025	100.00% 10	50.00% 10
POST TEST EXAM... 36 MOIS 2025	100.00% 10	50.00% 10
<b>Nombre total de participants</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

#	PRE TEST EXAME... 36 MOIS 2025	DATE
1	Alexandra	12/5/2025 9:42 AM
2	Stephanie	12/5/2025 8:45 AM
3	Annelise	12/5/2025 8:41 AM
4	Laetitia	12/5/2025 8:40 AM
5	Lucile	12/5/2025 8:40 AM
6	Jeanne	12/5/2025 8:40 AM
7	Nawelle	12/5/2025 8:37 AM
8	Carine	12/5/2025 8:36 AM
9	Mai Linh	12/5/2025 8:36 AM
10	Giovanna	12/5/2025 8:35 AM
#	POST TEST EXAM... 36 MOIS 2025	DATE
1	Alexandra	12/6/2025 4:40 PM
2	Giovanna	12/6/2025 4:37 PM
3	Laetitia	12/6/2025 4:33 PM
4	Jeanne	12/6/2025 4:33 PM
5	Annelise	12/6/2025 4:31 PM
6	Mai Linh	12/6/2025 4:31 PM
7	Carine	12/6/2025 4:31 PM
8	Stephanie	12/6/2025 4:30 PM
9	Nawelle	12/6/2025 4:28 PM
10	Lucile	12/6/2025 4:28 PM

**Q2 Nom**


Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0

	NOM	TOTAL
PRE TEST EXAME... 36 MOIS 2025	100.00% 10	50.00% 10
POST TEST EXAM... 36 MOIS 2025	100.00% 10	50.00% 10
<b>Nombre total de participants</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

#	PRE TEST EXAME... 36 MOIS 2025	DATE
1	Gauthier	12/5/2025 9:42 AM
2	Crenne	12/5/2025 8:45 AM
3	Segaud-Riffaud	12/5/2025 8:41 AM
4	Polycarpe	12/5/2025 8:40 AM
5	Mulin	12/5/2025 8:40 AM
6	Chougnet	12/5/2025 8:40 AM
7	Aliane	12/5/2025 8:37 AM
8	Araujo	12/5/2025 8:36 AM
9	PHAM DUC-MARTIN	12/5/2025 8:36 AM
10	Scaccabarozzi	12/5/2025 8:35 AM
#	POST TEST EXAM... 36 MOIS 2025	DATE
1	Gauthier	12/6/2025 4:40 PM
2	Scaccabarozzi	12/6/2025 4:37 PM
3	Polycarpe	12/6/2025 4:33 PM
4	Chougnet	12/6/2025 4:33 PM
5	Segaud-Riffaud	12/6/2025 4:31 PM
6	PHAM DUC- MARTIN	12/6/2025 4:31 PM
7	Araujo	12/6/2025 4:31 PM
8	Crenne	12/6/2025 4:30 PM
9	Aliane	12/6/2025 4:28 PM
10	Mulin	12/6/2025 4:28 PM

**Q3 Une surdité congénitale unilatérale de perception ne gêne pas l'acquisition du langage.**


Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0

■ Vrai■ Faux**Statistiques du quiz**Pourcentage de réponses correctes  
65%Score moyen  
0.7/1.0 (65%)Écart-type  
0.49Difficulté  
3/15

	<span style="color: green;">✓</span> VRAI	FAUX	TOTAL
PRE TEST EXAM... 36 MOIS 2025	40.00% 4	60.00% 6	50.00% 10
POST TEST EXAM... 36 MOIS 2025	90.00% 9	10.00% 1	50.00% 10
<b>Nombre total de participants</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>20</b>

**Q4 Un dépistage auditif normal en période néonatale par otoémission acoustique ou potentiel évoqué auditif garantit l'absence de surdité de perception à 3 ans.**

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0




**Statistiques du quiz**

Pourcentage de réponses correctes	Score moyen 1.0/1.0 (100%)	Écart-type 0.00	Difficulté 15/15
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL
PRE TEST EXAM... 36 MOIS 2025	0.00% 0	100.00% 10	50.00% 10
POST TEST EXAM... 36 MOIS 2025	0.00% 0	100.00% 10	50.00% 10
<b>Nombre total de participants</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

## Q5 Les otites séreuses sont causes de surdité de perception.

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



█ Vrai


█ Faux

### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 70%	Score moyen 0.7/1.0 (70%)	Écart-type 0.47	Difficulté 4/15
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL
PRE TEST EXAM... 36 MOIS 2025	30.00% 3	70.00% 7	50.00% 10
POST TEST EXAM... 36 MOIS 2025	30.00% 3	70.00% 7	50.00% 10
<b>Nombre total de participants</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>20</b>

**Q6 A 3 ans un bégaiement ou un langage jargon justifient une prise en charge orthophonique.**

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0




**Statistiques du quiz**

Pourcentage de réponses correctes	Score moyen 0.9/1.0 (90%)	Écart-type 0.31	Difficulté 9/15
	<span style="color: green;">✓</span> VRAI	FAUX	TOTAL
PRE TEST EXAM... 36 MOIS 2025	80.00% 8	20.00% 2	50.00% 10
POST TEST EXAM... 36 MOIS 2025	100.00% 10	0.00% 0	50.00% 10
<b>Nombre total de participants</b>	18	2	20

**Q7 Le questionnaire M-CHAT est un questionnaire spécifique pour le dépistage des Troubles du Spectre Autistique (TSA) validé de 9 mois à 3 ans.**

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0




**Statistiques du quiz**

Pourcentage de réponses correctes	Score moyen 0.5/1.0 (45%)	Écart-type 0.51	Difficulté 1/15
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL
PRE TEST EXAME... 36 MOIS 2025	90.00% 9	10.00% 1	50.00% 10
POST TEST EXAM... 36 MOIS 2025	20.00% 2	80.00% 8	50.00% 10
<b>Nombre total de participants</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>20</b>

## Q8 A 2 ans l'enfant doit connaître 3 couleurs.

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0




## Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 75%	Score moyen 0.8/1.0 (75%)	Écart-type 0.44	Difficulté 5/15
--	------------------------------	--------------------	--------------------

	VRAI	✓ FAUX	TOTAL
PRE TEST EXAM... 36 MOIS 2025	40.00% 4	60.00% 6	50.00% 10
POST TEST EXAM... 36 MOIS 2025	10.00% 1	90.00% 9	50.00% 10
Nombre total de participants	5	15	20

**Q9 Sachant qu'une acuité visuelle de 6/10 est normale à 3 ans, une acuité visuelle à 8/10 œil droit et 6/10 œil gauche justifie une consultation OPH.**

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0




#### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes	Score moyen 0.9/1.0 (90%)	Écart-type 0.31	Difficulté 9/15
	<span style="color: green;">✓</span> VRAI	FAUX	TOTAL
PRE TEST EXAM... 36 MOIS 2025	80.00% 8	20.00% 2	50.00% 10
POST TEST EXAM... 36 MOIS 2025	100.00% 10	0.00% 0	50.00% 10
<b>Nombre total de participants</b>	18	2	20

**Q10 L'hypermétropie est un trouble de réfraction en rapport avec un œil anatomiciquement trop long.**

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0




**Statistiques du quiz**

Pourcentage de réponses correctes	Score moyen 0.8/1.0 (80%)	Écart-type 0.41	Difficulté 7/15
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL
PRE TEST EXAME... 36 MOIS 2025	30.00% 3	70.00% 7	50.00% 10
POST TEST EXAM... 36 MOIS 2025	10.00% 1	90.00% 9	50.00% 10
<b>Nombre total de participants</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>20</b>

**Q11 Les lunettes à secteurs et les lunettes à écran sont toutes les deux utilisées pour le dépistage de l'amblyopie et du strabisme.**

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0




**Statistiques du quiz**

Pourcentage de réponses correctes 95%	Score moyen 1.0/1.0 (95%)	Écart-type 0.22	Difficulté 12/15
	VRAI	FAUX	TOTAL
PRE TEST EXAM... 36 MOIS 2025	90.00% 9	10.00% 1	50.00% 10
POST TEST EXAM... 36 MOIS 2025	100.00% 10	0.00% 0	50.00% 10
<b>Nombre total de participants</b>	19	1	20

**Q12 L'asymétrie de préhension d'un bâton est normale à 9 mois, âge de début de la latéralisation.**

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0




**Statistiques du quiz**

Pourcentage de réponses correctes	Score moyen 0.8/1.0 (75%)	Écart-type 0.44	Difficulté 5/15
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL
PRE TEST EXAM... 36 MOIS 2025	50.00% 5	50.00% 5	50.00% 10
POST TEST EXAM... 36 MOIS 2025	0.00% 0	100.00% 10	50.00% 10
<b>Nombre total de participants</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>20</b>

**Q13 A 2 ans l'enfant doit reproduire un pont de 3 cubes et une tour de 8 cubes.**

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0


**Statistiques du quiz**

Pourcentage de réponses correctes 80%	Score moyen 0.8/1.0 (80%)	Écart-type 0.41	Difficulté 7/15
--	------------------------------	--------------------	--------------------

	VRAI	✓ FAUX	TOTAL
PRE TEST EXAM... 36 MOIS 2025	40.00% 4	60.00% 6	50.00% 10
POST TEST EXAM... 36 MOIS 2025	0.00% 0	100.00% 10	50.00% 10
<b>Nombre total de participants</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>20</b>

## Q14 A 3 ans l'enfant reproduit un rond bien fermé avec une prise de crayon pouce-index.

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0




## Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes	Score moyen 0.9/1.0 (90%)	Écart-type 0.31	Difficulté 9/15
	✓ VRAI	FAUX	TOTAL
PRE TEST EXAM... 36 MOIS 2025	80.00% 8	20.00% 2	50.00% 10
POST TEST EXAM... 36 MOIS 2025	100.00% 10	0.00% 0	50.00% 10
<b>Nombre total de participants</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>20</b>

**Q15 Les plateformes de coordination et d'orientation (PCO) ont pour mission la prise en charge exclusive des troubles du spectre autistique (TSA).**

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



■ Vrai ■ Faux


**Statistiques du quiz**

Pourcentage de réponses correctes 95%	Score moyen 1.0/1.0 (95%)	Écart-type 0.22	Difficulté 12/15
--	------------------------------	--------------------	---------------------

	VRAI	✓ FAUX	TOTAL
PRE TEST EXAM... 36 MOIS 2025	10.00% 1	90.00% 9	50.00% 10
POST TEST EXAM... 36 MOIS 2025	0.00% 0	100.00% 10	50.00% 10
<b>Nombre total de participants</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>20</b>

**Q16 A 2 et 3 ans les critères d'adressage à la PCO sont 3 signes d'alerte dans 2 domaines différents (socialisation, langage, motricité fine, motricité globale.**

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0




#### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes	Score moyen 0.5/1.0 (50%)	Écart-type 0.51	Difficulté 2/15
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL
PRE TEST EXAME... 36 MOIS 2025	80.00% 8	20.00% 2	50.00% 10
POST TEST EXAM... 36 MOIS 2025	20.00% 2	80.00% 8	50.00% 10
<b>Nombre total de participants</b>	10	10	20

**Q17 La consultation « trouble de l'enfant » (CTE) valorisée à 60 euros, initialement dédiée aux TSA, a été étendue au dépistage des Troubles du Neurodéveloppement (TND) pour les pédiatres et généralistes.**

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



■ Vrai

■ Faux

#### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 95%	Score moyen 1.0/1.0 (95%)	Écart-type 0.22	Difficulté 12/15
PRE TEST EXAME... 36 MOIS 2025	90.00% 9	10.00% 1	50.00% 10
POST TEST EXAM... 36 MOIS 2025	100.00% 10	0.00% 0	50.00% 10
<b>Nombre total de participants</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>20</b>