


## Résumé du quiz

Score moyen

**93% • 17.6/19 PTS**



### Statistiques

Score le plus bas  
84%

Médiane  
92%

Score le plus élevé  
100%

Moyenne: 93%

Écart-type: 6%

### Classement des questions

## Quizz Les allergies alimentaires de l'enfant

QUESTIONS (18)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
<b>Q14</b> La DME et la présence d'un eczéma atopique sur le visage sont-elles compatibles	1	60%
<b>Q9</b> L'adrénaline n'est pas systématiquement prescrite dans un PAI	2	70%
<b>Q17</b> L'éviction alimentaire est le seul traitement sûr et efficace	3	80%
<b>Q18</b> La noix de pécan croise avec la noix de Grenoble	3	80%
<b>Q4</b> L'œsophagite à éosinophile est un diagnostic uniquement clinique	5	90%
<b>Q20</b> Un IgE ovomucoïde < 0,1 ku/l autorise l'ingestion d'oeuf cuit	5	90%
<b>Q10</b> La gravité de l'allergie alimentaire dépend	7	95%
<b>Q3</b> Les vomissements survenus deux heures après le repas ne sont pas de l'allergie alimentaire	8	100%
<b>Q5</b> Le Trophatop® pédiatrique est un bon examen de dépistage	8	100%
<b>Q6</b> Nommer les examens biologiques utiliser pour le diagnostic d'allergie alimentaire	8	100%
<b>Q7</b> Les prick tests sont réservés aux spécialistes	8	100%
<b>Q8</b> Pour traiter un bronchospasme secondaire à une allergie alimentaire j'utilise en premier lieu	8	100%
<b>Q11</b> Il faut attendre l'âge de trois ans pour introduire les arachides	8	100%
<b>Q12</b> La présence d'une urticaire est pathognomonique d'une réaction allergique	8	100%
<b>Q13</b> Les allergologues peuvent explorer les allergies alimentaires quel que soit l'âge de l'enfant	8	100%
<b>Q15</b> Le PAI est un document d'expert, et ne peut être rédiger par un pédiatre généraliste	8	100%
<b>Q16</b> La prévalence de l'allergie alimentaire est en forte augmentation	8	100%
<b>Q19</b> Le lait Capricare® peut être une alternative chez un allergique au lait de vache	8	100%

## Q1 Prénom

Réponses obtenues : 10    Question(s) ignorée(s) : 0

#	RÉPONSES	DATE
1	Karina	12/6/2025 4:21 PM
2	Charlotte	12/6/2025 4:21 PM
3	Francisco	12/6/2025 4:21 PM
4	Sophie	12/6/2025 4:21 PM
5	Agathe	12/6/2025 4:21 PM
6	sandra	12/6/2025 4:20 PM
7	Jacky	12/6/2025 4:20 PM
8	Franelle	12/6/2025 4:20 PM
9	Dominique	12/6/2025 4:20 PM
10	Céline	12/6/2025 4:18 PM


## Q2 Nom

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0

#	RÉPONSES	DATE
1	Morales	12/6/2025 4:21 PM
2	Tournan	12/6/2025 4:21 PM
3	Funes de la Vega	12/6/2025 4:21 PM
4	Moniez	12/6/2025 4:21 PM
5	Labit	12/6/2025 4:21 PM
6	brancato	12/6/2025 4:20 PM
7	Cuzzi	12/6/2025 4:20 PM
8	COCATRIX	12/6/2025 4:20 PM
9	Baranowski	12/6/2025 4:20 PM
10	Bonamy	12/6/2025 4:18 PM

### Q3 Les vomissements survenus deux heures après le repas ne sont pas de l'allergie alimentaire

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



#### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
100%

Score moyen  
1.0/1.0 (100%)


Écart-type  
0.00

Difficulté  
8/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	0.00%	0
✓ Faux	1/1	100.00%	10
<b>TOTAL</b>			<b>10</b>

## Q4 L'œsophagite à éosinophile est un diagnostic uniquement clinique

Réponses obtenues : 10    Question(s) ignorée(s) : 0




### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 90%	Score moyen 0.9/1.0 (90%)	Écart-type 0.32	Difficulté 5/18
--	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	10.00%	1
✓ Faux	1/1	90.00%	9
<b>TOTAL</b>			<b>10</b>

## Q5 Le Trophatop® pédiatrique est un bon examen de dépistage

Réponses obtenues : 10    Question(s) ignorée(s) : 0




### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 100%	Score moyen 1.0/1.0 (100%)	Écart-type 0.00	Difficulté 8/18
---	-------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	0.00%	0
<input checked="" type="checkbox"/> Faux	1/1	100.00%	10
<b>TOTAL</b>			<b>10</b>

## Q6 Nommer les examens biologiques utiliser pour le diagnostic d'allergie alimentaire

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
100%

Score moyen  
1.0/1.0 (100%)

Écart-type  
0.00


Difficulté  
8/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
NFSp	0/1	10.00%	1
✓ IgE spécifique unitaire	1/1	100.00%	10
IgE totales	0/1	10.00%	1
Phadiatop®	0/1	10.00%	1
Trophatop®	0/1	0.00%	0

Nombre total de participants: 10

## Q7 Les prick tests sont réservés aux spécialistes

Réponses obtenues : 10    Question(s) ignorée(s) : 0




### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 100%	Score moyen 1.0/1.0 (100%)	Écart-type 0.00	Difficulté 8/18
---	-------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	0.00%	0
✓ Faux	1/1	100.00%	10
<b>TOTAL</b>			<b>10</b>

## Q8 Pour traiter un bronchospasme secondaire à une allergie alimentaire j'utilise en premier lieu

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz


Pourcentage de réponses correctes	Score moyen	Écart-type	Difficulté
100%	1.0/1.0 (100%)	0.00	8/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
une corticothérapie orale	0/1	0.00%	0
des BDCA	0/1	0.00%	0
✓ de l'adrénaline IM	1/1	100.00%	10
un antihistaminique	0/1	0.00%	0
Cela est dû à sa latéralité à gauche	0/1	0.00%	0

Nombre total de participants: 10

## Q9 L'adrénaline n'est pas systématiquement prescrite dans un PAI

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0




## Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
70%      Score moyen  
0.7/1.0 (70%)      Écart-type  
0.48      Difficulté  
2/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	70.00%	7
Faux	0/1	30.00%	3
Cela rassure sur la bonne intelligence	0/1	0.00%	0
<b>TOTAL</b>			<b>10</b>

Q10 La gravité de l'allergie alimentaire dépend

Réponses obtenues : 10      Question(s) ignorée(s) : 0




## Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 90%	Score moyen 1.9/2.0 (95%)	Écart-type 0.32	Difficulté 7/18
CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ de l'allergène	1/2	90.00%	9
✓ de l'âge de survenue	1/2	100.00%	10
du sexe de l'enfant	0/2	0.00%	0
de la prématurité	0/2	10.00%	1
de l'eczéma atopique associé	0/2	60.00%	6
<b>Nombre total de participants: 10</b>			

## Q11 Il faut attendre l'âge de trois ans pour introduire les arachides

Réponses obtenues : 10    Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
100%

Score moyen  
1.0/1.0 (100%)


Écart-type  
0.00

Difficulté  
8/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	0.00%	0
✓ Faux	1/1	100.00%	10
<b>TOTAL</b>			<b>10</b>

## Q12 La présence d'une urticaire est pathognomonique d'une réaction allergique

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
100%

Score moyen  
1.0/1.0 (100%)


Écart-type  
0.00

Difficulté  
8/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	0.00%	0
✓ Faux	1/1	100.00%	10
<b>TOTAL</b>			<b>10</b>

## Q13 Les allergologues peuvent explorer les allergies alimentaires quel que soit l'âge de l'enfant

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
100%

Score moyen  
1.0/1.0 (100%)


Écart-type  
0.00

Difficulté  
8/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	100.00%	10
Faux	0/1	0.00%	0
<b>TOTAL</b>			<b>10</b>

## Q14 La DME et la présence d'un eczéma atopique sur le visage sont-elles compatibles

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0




### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 60% Score moyen 0.6/1.0 (60%) Écart-type 0.52 Difficulté 1/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	40.00%	4
✓ Faux	1/1	60.00%	6
<b>TOTAL</b>			<b>10</b>

## Q15 Le PAI est un document d'expert, et ne peut être rédiger par un pédiatre généraliste

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0




### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 100%	Score moyen 1.0/1.0 (100%)	Écart-type 0.00	Difficulté 8/18
---	-------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	0.00%	0
✓ Faux	1/1	100.00%	10
<b>TOTAL</b>			<b>10</b>

## Q16 La prévalence de l'allergie alimentaire est en forte augmentation

Réponses obtenues : 10    Question(s) ignorée(s) : 0




### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 100%	Score moyen 1.0/1.0 (100%)	Écart-type 0.00	Difficulté 8/18
---	-------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	100.00%	10
Faux	0/1	0.00%	0
<b>TOTAL</b>			<b>10</b>

## Q17 L'éviction alimentaire est le seul traitement sûr et efficace

Réponses obtenues : 10    Question(s) ignorée(s) : 0




### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 80%    Score moyen 0.8/1.0 (80%)    Écart-type 0.42    Difficulté 3/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	20.00%	2
✓ Faux	1/1	80.00%	8
<b>TOTAL</b>			<b>10</b>

## Q18 La noix de pécan croise avec la noix de Grenoble

Réponses obtenues : 10    Question(s) ignorée(s) : 0




### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 80%	Score moyen 0.8/1.0 (80%)	Écart-type 0.42	Difficulté 3/18
--	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	POURCENTAGE	POURCENTAGE
Vrai	1/1	80.00%	8	8
Faux	0/1	20.00%	2	2
<b>TOTAL</b>			<b>10</b>	

## Q19 Le lait Capricare® peut être une alternative chez un allergique au lait de vache

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0




### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 100%	Score moyen 1.0/1.0 (100%)	Écart-type 0.00	Difficulté 8/18
---	-------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	0.00%	0
✓ Faux	1/1	100.00%	10
<b>TOTAL</b>			<b>10</b>

## Q20 Un IgE ovomucoïde &lt; 0,1 ku/l autorise l'ingestion d'oeuf cuit

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



## Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 90%	Score moyen 0.9/1.0 (90%)	Écart-type 0.32	Difficulté 5/18
--	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	%
Vrai	1/1	90.00%	9
Faux	0/1	10.00%	1
<b>TOTAL</b>			<b>10</b>