


Résumé du quiz

Score moyen

79% • 15.1/19 PTS



Statistiques

Score le plus bas
47%

Médiane
82%

Score le plus élevé
95%

Moyenne: 79%

Écart-type: 14%

Classement des questions

Quizz Les allergies alimentaires de l'enfant

QUESTIONS (18)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q14 La DME et la présence d'un eczéma atopique sur le visage sont-elles compatibles	1	20%
Q8 Pour traiter un bronchospasme secondaire à une allergie alimentaire j'utilise en premier lieu	2	50%
Q17 L'éviction alimentaire est le seul traitement sûr et efficace	2	50%
Q3 Les vomissements survenus deux heures après le repas ne sont pas de l'allergie alimentaire	4	60%
Q9 L'adrénaline n'est pas systématiquement prescrite dans un PAI	5	70%
Q10 La gravité de l'allergie alimentaire dépend	6	75%
Q5 Le Trophatop® pédiatrique est un bon examen de dépistage	7	80%
Q19 Le lait Capricare® peut être une alternative chez un allergique au lait de vache	7	80%
Q6 Nommer les examens biologiques utiliser pour le diagnostic d'allergie alimentaire	9	90%
Q7 Les prick tests sont réservés aux spécialistes	9	90%
Q13 Les allergologues peuvent explorer les allergies alimentaires quel que soit l'âge de l'enfant	9	90%
Q18 La noix de pécan croise avec la noix de Grenoble	9	90%
Q20 Un IgE ovomucoïde < 0,1 ku/l autorise l'ingestion d'oeuf cuit	9	90%
Q4 L'œsophagite à éosinophile est un diagnostic uniquement clinique	14	100%
Q11 Il faut attendre l'âge de trois ans pour introduire les arachides	14	100%
Q12 La présence d'une urticaire est pathognomonique d'une réaction allergique	14	100%
Q15 Le PAI est un document d'expert, et ne peut être rédiger par un pédiatre généraliste	14	100%
Q16 La prévalence de l'allergie alimentaire est en forte augmentation	14	100%

Q1 Prénom

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0

#	RÉPONSES	DATE
1	Dominique	12/5/2025 9:18 AM
2	Karina	12/5/2025 9:18 AM
3	Agathe	12/5/2025 9:12 AM
4	Celine	12/5/2025 9:11 AM
5	Sophie	12/5/2025 9:11 AM
6	Charlotte	12/5/2025 9:11 AM
7	Francisco	12/5/2025 9:10 AM
8	Franelle	12/5/2025 9:09 AM
9	Jacky	12/5/2025 9:09 AM
10	sandra	12/5/2025 9:09 AM


Q2 Nom

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0

#	RÉPONSES	DATE
1	Baranowski	12/5/2025 9:18 AM
2	Morales	12/5/2025 9:18 AM
3	Labit	12/5/2025 9:12 AM
4	Bonamy	12/5/2025 9:11 AM
5	Moniez	12/5/2025 9:11 AM
6	Tournan	12/5/2025 9:11 AM
7	Funes de la Vega	12/5/2025 9:10 AM
8	COCATRIX	12/5/2025 9:09 AM
9	Cuzzi	12/5/2025 9:09 AM
10	brancato	12/5/2025 9:09 AM

Q3 Les vomissements survenus deux heures après le repas ne sont pas de l'allergie alimentaire

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
60% Score moyen
0.6/1.0 (60%) Écart-type
0.52 Difficulté
4/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	40.00%	4
✓ Faux	1/1	60.00%	6
TOTAL			10

Q4 L'œsophagite à éosinophile est un diagnostic uniquement clinique

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 100%	Score moyen 1.0/1.0 (100%)	Écart-type 0.00	Difficulté 14/18
---	-------------------------------	--------------------	---------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	0.00%	0
✓ Faux	1/1	100.00%	10
TOTAL			10

Q5 Le Trophatop® pédiatrique est un bon examen de dépistage

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(e)s : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 80%	Score moyen 0.8/1.0 (80%)	Écart-type 0.42	Difficulté 7/18
--	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	20.00%	2
✓ Faux	1/1	80.00%	8
TOTAL			10

Q6 Nommer les examens biologiques utiliser pour le diagnostic d'allergie alimentaire

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz


Pourcentage de réponses correctes	Score moyen 0.9/1.0 (90%)	Écart-type 0.32	Difficulté 9/18
-----------------------------------	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
NFSp	0/1	0.00%	0
✓ IgE spécifique unitaire	1/1	90.00%	9
IgE totales	0/1	30.00%	3
Phadiatop®	0/1	10.00%	1
Trophatop®	0/1	30.00%	3

Nombre total de participants: 10

Q7 Les prick tests sont réservés aux spécialistes

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
90%

Score moyen
0.9/1.0 (90%)


Écart-type
0.32

Difficulté
9/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	POURCENTAGE
Vrai	0/1	1	10.00%
✓ Faux	1/1	9	90.00%
TOTAL			10

Q8 Pour traiter un bronchospasme secondaire à une allergie alimentaire j'utilise en premier lieu

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz


Pourcentage de réponses correctes 50%	Score moyen 0.5/1.0 (50%)	Écart-type 0.53	Difficulté 2/18
--	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
une corticothérapie orale	0/1	0.00%	0
des BDCA	0/1	50.00%	5
✓ de l'adrénaline IM	1/1	50.00%	5
un antihistaminique	0/1	0.00%	0
Cela est dû à sa latéralité à gauche	0/1	0.00%	0

Nombre total de participants: 10

Q9 L'adrénaline n'est pas systématiquement prescrite dans un PAI

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 70%	Score moyen 0.7/1.0 (70%)	Écart-type 0.48	Difficulté 5/18
CHOIX DE RÉPONSES			
✓ Vrai	1/1	70.00%	7
Faux	0/1	30.00%	3
Cela rassure sur la bonne intelligence	0/1	0.00%	0
TOTAL			10

Q10 La gravité de l'allergie alimentaire dépend

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 60%	Score moyen 1.5/2.0 (75%)	Écart-type 0.71	Difficulté 6/18
CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ de l'allergène	1/2	80.00%	8
✓ de l'âge de survenue	1/2	70.00%	7
du sexe de l'enfant	0/2	10.00%	1
de la prématurité	0/2	10.00%	1
de l'eczéma atopique associé	0/2	30.00%	3
Nombre total de participants: 10			

Q11 Il faut attendre l'âge de trois ans pour introduire les arachides

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
14/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	0.00%	0
✓ Faux	1/1	100.00%	10
TOTAL			10

Q12 La présence d'une urticaire est pathognomonique d'une réaction allergique

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
14/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	0.00%	0
✓ Faux	1/1	100.00%	10
TOTAL			10

Q13 Les allergologues peuvent explorer les allergies alimentaires quel que soit l'âge de l'enfant

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 90%	Score moyen 0.9/1.0 (90%)	Écart-type 0.32	Difficulté 9/18
--	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
✓ Vrai	1/1	90.00%	9
Faux	0/1	10.00%	1
TOTAL			10

Q14 La DME et la présence d'un eczéma atopique sur le visage sont-elles compatibles

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
20% Score moyen
0.2/1.0 (20%) Écart-type
0.42 Difficulté
1/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	80.00%	8
✓ Faux	1/1	20.00%	2
TOTAL			10

Q15 Le PAI est un document d'expert, et ne peut être rédiger par un pédiatre généraliste

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
100%

Score moyen
1.0/1.0 (100%)


Écart-type
0.00

Difficulté
14/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	0.00%	0
✓ Faux	1/1	100.00%	10
TOTAL			10

Q16 La prévalence de l'allergie alimentaire est en forte augmentation

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(e)s : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 100%	Score moyen 1.0/1.0 (100%)	Écart-type 0.00	Difficulté 14/18
---	-------------------------------	--------------------	---------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	POURCENTAGE
Vrai	1/1	100.00%	10
Faux	0/1	0.00%	0
TOTAL			10

Q17 L'éviction alimentaire est le seul traitement sûr et efficace

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(e)s : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 50%	Score moyen 0.5/1.0 (50%)	Écart-type 0.53	Difficulté 2/18
--	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	POURCENTAGE
Vrai	0/1	50.00%	5
✓ Faux	1/1	50.00%	5
TOTAL			10

Q18 La noix de pécan croise avec la noix de Grenoble

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(e)s : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 90%	Score moyen 0.9/1.0 (90%)	Écart-type 0.32	Difficulté 9/18
--	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	%
Vrai	1/1	90.00%	9
Faux	0/1	10.00%	1
TOTAL			10

Q19 Le lait Capricare® peut être une alternative chez un allergique au lait de vache

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0




Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes
80% Score moyen
0.8/1.0 (80%) Écart-type
0.42 Difficulté
7/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	0/1	20.00%	2
✓ Faux	1/1	80.00%	8
TOTAL			10

Q20 Un IgE ovomucoïde < 0,1 ku/l autorise l'ingestion d'oeuf cuit

Réponses obtenues : 10 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes	Score moyen	Écart-type	Difficulté
90%	0.9/1.0 (90%)	0.32	9/18

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES	
Vrai	1/1	90.00%	9
Faux	0/1	10.00%	1
TOTAL			10