


Résumé du quiz

Score moyen

77% • 19/25 PTS



Statistiques

Score le plus bas
40%

Médiane
78%

Score le plus élevé
96%

Moyenne: 77%

Écart-type: 14%

Classement des questions

Quizz Examens systématiques 4 ans, 5ans et 6 ans

QUESTIONS (11)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
Q13 Vision Dites si les propositions sont vraies. Cochez les 2 bonnes réponses	1	53%
Q4 A 4 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles pour lesquelles l'orthophonie peut être l'unique prise en charge, dès que possible ? (cocher les 2 bonnes réponses)	2	61%
Q7 A 5 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles pour lesquelles l'orthophonie peut être l'unique prise en charge, dès que possible ? (cocher les 2 bonnes réponses)	3	67%
Q8 5 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles qui relèvent de la Plateforme de coordination et d'orientation (PCO) de votre département ? (cocher les 2 bonnes réponses)	4	72%
Q3 A 4 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles pour lesquelles vous devez vous inquiéter et réaliser une prise en charge rapide ? (cocher les 4 bonnes réponses)	5	79%
Q12 Audition : Dites si les propositions sont vraies. Cochez les 2 bonnes réponses	6	79%
Q9 A 6 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles pour lesquelles vous devez vous inquiéter et réaliser une prise en charge rapide ? (cocher les 3 bonnes réponses)	7	81%
Q11 A 6 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles qui relèvent de la Plateforme de coordination et d'orientation de votre département ? (cocher les 2 bonnes réponses)	8	85%
Q5 A 4 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles qui relèvent de la plateforme de coordination et d'orientation (PCO) de votre département ? (cocher les 2 bonnes réponses)	9	86%
Q6 A 5 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles pour lesquelles vous devez vous inquiéter et réaliser une prise en charge rapide ? (cocher les 3 bonnes réponses)	10	93%
Q10 A 6 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles pour lesquelles l'orthophonie peut être l'unique prise en charge, dès que possible ? (cocher la bonne réponse)	11	94%

Q1 Prénom

Réponses obtenues : 17 Question(s) ignorée(s) : 1

#	RÉPONSES	DATE
1	Edwige	12/18/2025 12:30 PM
2	Nicolas	12/18/2025 9:37 AM
3	Camille	12/18/2025 9:27 AM
4	Laetitia	12/18/2025 9:23 AM
5	Frieda	12/18/2025 9:21 AM
6	Zied	12/18/2025 9:20 AM
7	Lindsay	12/18/2025 9:13 AM
8	Aurélie	12/18/2025 9:13 AM
9	Alexandra	12/18/2025 9:12 AM
10	Emilie	12/18/2025 9:12 AM
11	Nawelle	12/18/2025 9:11 AM
12	Véronique	12/18/2025 9:11 AM
13	Jamal	12/18/2025 9:09 AM
14	Lucie	12/18/2025 9:09 AM
15	Isabelle	12/18/2025 9:08 AM
16	Evelyne	12/18/2025 9:07 AM
17	Caroline	12/18/2025 9:03 AM


Q2 Nom

Réponses obtenues : 17 Question(s) ignorée(s) : 1

#	RÉPONSES	DATE
1	Dakouri	12/18/2025 12:30 PM
2	Naudin	12/18/2025 9:37 AM
3	Lheimeur	12/18/2025 9:27 AM
4	Baudesson	12/18/2025 9:23 AM
5	Lutula	12/18/2025 9:21 AM
6	Merchaoui	12/18/2025 9:20 AM
7	Detavernier	12/18/2025 9:13 AM
8	Dumas	12/18/2025 9:13 AM
9	De Almeida	12/18/2025 9:12 AM
10	Beffara Moretti	12/18/2025 9:12 AM
11	Aliane	12/18/2025 9:11 AM
12	Oyharçabal bourden	12/18/2025 9:11 AM
13	GHAZOUANI	12/18/2025 9:09 AM
14	Calamy	12/18/2025 9:09 AM
15	Py	12/18/2025 9:08 AM
16	Pinglier	12/18/2025 9:07 AM
17	Thach	12/18/2025 9:03 AM

Q3 A 4 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles pour lesquelles vous devez vous inquiéter et réaliser une prise en charge rapide ? (cocher les 4 bonnes réponses)

Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz


Pourcentage de réponses correctes	Score moyen	Écart-type	Difficulté
39%	3.2/4.0 (79%)	0.86	5/11

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ Un enfant qui parle très mal et dont l'enseignante s'inquiète d'un retard dans le graphisme et la compréhension	1/4	100.00% 18
Un enfant sans antécédent familial qui présente un trouble articulatoire avec des zozotements et des confusions t/c/d (ex : crapo ou drapeau, travate ou cravate)	0/4	50.00% 9
✓ Un enfant qui bégaye	1/4	50.00% 9
✓ Un enfant qui ne croise pas le regard, garde des troubles du sommeil, une alimentation sélective, une marche sur la pointe des pieds et un langage souvent en écholalie	1/4	94.44% 17
✓ Un enfant qui est à peine intelligible quand il parle, mais qui a un graphisme normal et peut réaliser un pont de 5 cubes	1/4	72.22% 13

Nombre total de participants: 18

Q4 A 4 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles pour lesquelles l'orthophonie peut être l'unique prise en charge, dès que possible ? (cocher les 2 bonnes réponses)

Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes	Score moyen	Écart-type	Difficulté
28%	1.2/2.0 (61%)	0.55	2/11


CHOIX DE RÉPONSES

	SCORE	RÉPONSES
Un enfant qui parle très mal et dont l'enseignante s'inquiète d'un retard dans le graphisme et la compréhension	0/2	16.67% 3
Un enfant sans antécédent familial qui présente un trouble articulatoire avec des zozotements et des confusions t/c/d (ex : crapo ou drapeau, travate ou cravate)	0/2	66.67% 12
✓ Un enfant qui bégai...	1/2	72.22% 13
Un enfant qui ne croise pas le regard, garde des troubles du sommeil, une alimentation sélective, une marche sur la pointe des pieds et un langage souvent en écholalie	0/2	5.56% 1
✓ Un enfant qui est à peine intelligible quand il parle, mais qui a un graphisme normal et peut réaliser un pont de 5 cubes	1/2	50.00% 9

Nombre total de participants: 18

Q5 A 4 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles qui relèvent de la plateforme de coordination et d'orientation (PCO) de votre département ? (cocher les 2 bonnes réponses)

Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz


Pourcentage de réponses correctes 72%	Score moyen 1.7/2.0 (86%)	Écart-type 0.46	Difficulté 9/11
--	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES		SCORE	RÉPONSES
✓ 1. Un enfant qui parle très mal et dont l'enseignante s'inquiète d'un retard dans le graphisme et la compréhension	1/2	72.22%	13
1. Un enfant sans antécédent familial qui présente un trouble articulatoire avec des zozotements et des confusions t/c/d (ex : crapo ou drapeau, travate ou cravate)	0/2	11.11%	2
1. Un enfant qui bégaye	0/2	5.56%	1
		100.00%	
✓ 1. Un enfant qui ne croise pas le regard, garde des troubles du sommeil, une alimentation sélective, une marche sur la pointe des pieds et un langage souvent en écholalie	1/2		18
1. Un enfant qui est à peine intelligible quand il parle, mais qui a un graphisme normal et peut réaliser un pont de 5 cubes	0/2	16.67%	3

Nombre total de participants: 18

Q6 A 5 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles pour lesquelles vous devez vous inquiéter et réaliser une prise en charge rapide ? (cocher les 3 bonnes réponses)

Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz


Pourcentage de réponses correctes	Score moyen	Écart-type	Difficulté
78%	2.8/3.0 (93%)	0.43	10/11

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ Un enfant dont la mère était traitée par Valproate pendant la grossesse, et qui présente un retard de langage en expression et compréhension, un accès très partiel à la comptine numérique, et un graphisme très immature.	1/3	94.44% 17
Un enfant qui garde une énurésie primaire isolée	0/3	0.00% 0
✓ Un enfant né à terme de 29 SA, qui a un développement moteur dans les normes, mais qui inquiète l'enseignante car il a de grosses difficultés en graphisme (bonhomme têtard immature, ne dessine pas le carré) et ne peut compter jusqu'à 10.	1/3	83.33% 15
✓ Un enfant, qui reste peu intelligible à 5 ans, dont le frère est dysphasique, avec un langage agrammatical, malgré une prise en charge orthophonique débutée à 4 ans	1/3	100.00% 18
Un enfant de MSM qui confond les consonnes et est partiellement intelligible, sans difficulté de compréhension.	0/3	11.11% 2

Nombre total de participants: 18

Q7 A 5 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles pour lesquelles l'orthophonie peut être l'unique prise en charge, dès que possible ? (cocher les 2 bonnes réponses)

Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes	Score moyen	Écart-type	Difficulté
39%	1.3/2.0 (67%)	0.59	3/11


CHOIX DE RÉPONSES

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Un enfant dont la mère était traitée par Valproate pendant la grossesse, et qui présente un retard de langage en expression et compréhension, un accès très partiel à la comptine numérique, et un graphisme très immature	0/2	16.67% 3
Un enfant qui garde une énurésie primaire isolée	0/2	0.00% 0
Un enfant né à terme de 29 SA, qui a un développement moteur dans les normes, mais qui inquiète l'enseignante car il a de grosses difficultés en graphisme (bonhomme tétard immature, ne dessine pas le carré) et ne peut compter jusqu'à 10.	0/2	38.89% 7
✓ Un enfant qui reste peu intelligible à 5 ans, dont le frère est dysphasique, avec un langage agrammatical, malgré une prise en charge orthophonique débutée à 4 ans.	1/2	50.00% 9
✓ Un enfant de MSM qui confond les consonnes et est partiellement intelligible, sans difficulté de compréhension.	1/2	83.33% 15

Nombre total de participants: 18

Q8 5 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles qui relèvent de la Plateforme de coordination et d'orientation (PCO) de votre département ? (cocher les 2 bonnes réponses)

Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz


Pourcentage de réponses correctes	Score moyen	Écart-type	Difficulté
44%	1.4/2.0 (72%)	0.51	4/11

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ Un enfant dont la mère était traitée par Valproate pendant la grossesse, et qui présente un retard de langage en expression et compréhension, un accès très partiel à la comptine numérique, et un graphisme très immature.une corticothérapie orale	1/2	83.33% 15
Un enfant qui garde une énurésie primaire isolée	0/2	0.00% 0
✓ Un enfant né à terme de 29 SA, qui a un développement moteur dans les normes, mais qui inquiète l'enseignante car il a de grosses difficultés en graphisme (bonhomme têtard immature, ne dessine pas le carré) et ne peut compter jusqu'à 10.	1/2	61.11% 11
Un enfant, dont le frère est dysphasique, qui reste peu intelligible à 5 ans, avec un langage agrammatical, malgré une prise en charge orthophonique débutée à 4 ans	0/2	66.67% 12
Un enfant de MSM qui confond les consonnes et est partiellement intelligible, sans difficulté de compréhension.	0/2	0.00% 0

Nombre total de participants: 18

Q9 A 6 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles pour lesquelles vous devez vous inquiéter et réaliser une prise en charge rapide ? (cocher les 3 bonnes réponses)

Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz


Pourcentage de réponses correctes	Score moyen	Écart-type	Difficulté
50%	2.4/3.0 (81%)	0.62	7/11

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ Un enfant très agité depuis la petite enfance, qui a beaucoup de mal à tenir en place et à rester attentif en cours de CP. Il présente également des difficultés en motricité fine (pianotage, graphisme)	1/3	94.44% 17
✓ Un enfant qui avait été suivi en orthophonie pour un retard de langage et qui, en fin de GSM, transforme encore beaucoup les mots et ne peut pas segmenter les mots en syllabes	1/3	55.56% 10
Un enfant qui a toujours été vif, qui s'agitte volontiers sur sa chaise, bavarde parfois en classe, mais qui rentre parfaitement dans les apprentissages	0/3	5.56% 1
Un enfant qui a appris seul à lire en maternelle, est passionné de préhistoire, est très à l'aise dans les conversations d'adultes, mais a peu d'amis en CP.	0/3	16.67% 3
✓ Un enfant dont le frère est en ULIS, qui a toujours été considéré comme immature, qui en fin de GSM, ne peut raconter une histoire de façon chronologique, ne reconnaît que 3 chiffres et ne peut dénombrer au-delà de 5.	1/3	94.44% 17

Nombre total de participants: 18

Q10 A 6 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles pour lesquelles l'orthophonie peut être l'unique prise en charge, dès que possible ? (cocher la bonne réponse)

Réponses obtenues : 17 Question(s) ignorée(s) : 1



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes	Score moyen	Écart-type	Difficulté
89%	0.9/1.0 (94%)	0.24	11/11


CHOIX DE RÉPONSES

Choix de réponse	Score	Réponses
Un enfant très agité depuis la petite enfance, qui a beaucoup de mal à tenir en place et à rester attentif en cours de CP. Il présente également des difficultés en motricité fine (pianotage, graphisme)	0/1	0.00% 0
✓ Un enfant qui avait été suivi en orthophonie pour un retard de langage et qui, en fin de GSM, transforme encore beaucoup les mots et ne peut pas segmenter les mots en syllabes.	1/1	94.12% 16
Un enfant qui a toujours été vif, qui s'agitte volontiers sur sa chaise, bavarde parfois en classe, mais qui rentre parfaitement dans les apprentissages	0/1	5.88% 1
Un enfant qui a appris seul à lire en maternelle, est passionné de préhistoire, est très à l'aise dans les conversations d'adultes, mais a peu d'amis en CP.	0/1	5.88% 1
Un enfant dont le frère est en ULIS, qui a toujours été considéré comme immature, qui en fin de GSM, ne peut raconter une histoire de façon chronologique, ne reconnaît que 3 chiffres et ne peut dénombrer au-delà de 5.	0/1	17.65% 3

Nombre total de participants: 17

Q11 A 6 ans, parmi les situations suivantes, quelles sont celles qui relèvent de la Plateforme de coordination et d'orientation de votre département ? (cocher les 2 bonnes réponses)

Réponses obtenues : 17 Question(s) ignorée(s) : 1



Statistiques du quiz


Pourcentage de réponses correctes	Score moyen	Écart-type	Difficulté
67%	1.7/2.0 (85%)	0.47	8/11

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ 1. Un enfant très agité depuis la petite enfance, qui a beaucoup de mal à tenir en place et à rester attentif en cours de CP. Il présente également des difficultés en motricité fine (pianotage, graphisme)	1/2	82.35% 14
Un enfant qui avait été suivi en orthophonie pour un retard de langage et qui, en fin de GSM, transforme encore beaucoup les mots et ne peut pas segmenter les mots en syllabes	0/2	11.76% 2
Un enfant qui a toujours été vif, qui s'agitait volontiers sur sa chaise, bavarde parfois en classe, mais qui rentre parfaitement dans les apprentissages	0/2	5.88% 1
Un enfant qui a appris seul à lire en maternelle, est passionné de préhistoire, est très à l'aise dans les conversations d'adultes, mais a peu d'amis en CP	0/2	11.76% 2
✓ Un enfant dont le frère est en ULIS, qui a toujours été considéré comme immature, qui en fin de GSM, ne peut raconter une histoire de façon chronologique, ne reconnaît que 3 chiffres et ne peut dénombrer au-delà de 5.	1/2	88.24% 15

Nombre total de participants: 17

Q12 Audition : Dites si les propositions sont vraies. Cochez les 2 bonnes réponses

Réponses obtenues : 17 Question(s) ignorée(s) : 1



Statistiques du quiz


Pourcentage de réponses correctes	Score moyen	Écart-type	Difficulté
56%	1.6/2.0 (79%)	0.51	6/11

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Un dépistage auditif normal en période néonatale par oto-émission ou potentiel évoqué auditif garantit l'absence de surdité de perception à 4 ans.	0/2	11.76% 2
Pour un dépistage auditif, il faut une audiométrie tonale (avec un casque).	0/2	5.88% 1
✓ A l'examen de 6 ans, le test auditif doit se faire les 2 oreilles séparées si on veut dépister une cophose unilatérale qui est responsable de troubles d'apprentissage en primaire	1/2	70.59% 12
✓ Le test à la voix chuchotée doit se faire à voix très basse (30 décibels) et en cachant sa bouche.	1/2	88.24% 15
Le tympanomètre est un moyen de dépistage de trouble auditif	0/2	29.41% 5

Nombre total de participants: 17

Q13 Vision Dites si les propositions sont vraies. Cochez les 2 bonnes réponses

Réponses obtenues : 18 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 22%	Score moyen 1.1/2.0 (53%)	Écart-type 0.64	Difficulté 1/11
--	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ L'acuité visuelle se détermine préférentiellement avec des échelles logarithmiques	1/2	50.00%
Un test de Lang II est un test de dépistage de l'hypermétropie	0/2	16.67%
La réalisation d'une autoréfractométrie est un bon moyen de dépistage visuel	0/2	38.89%
✓ A 6 ans, une acuité visuelle de 10/10 à droite et 8/10 à gauche justifie une consultation en ophtalmologie	1/2	55.56%
Il est indispensable d'évaluer l'acuité visuelle de	0/2	44.44%

Nombre total de participants: 18