


# Quizz Les allergies alimentaires de l'enfant

## Résumé du quiz



### Statistiques

Score le plus bas  
47%

Médiane  
89%

Score le plus élevé  
100%

Moyenne: 86%

Écart-type: 13%

### Classement des questions

QUESTIONS (18)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
<b>Q14</b> La DME et la présence d'un eczéma atopique sur le visage sont-elles compatibles	1	40%
<b>Q17</b> L'éviction alimentaire est le seul traitement sûr et efficace	2	65%
<b>Q9</b> L'adrénaline n'est pas systématiquement prescrite dans un PAI	3	70%
<b>Q8</b> Pour traiter un bronchospasme secondaire à une allergie alimentaire j'utilise en premier lieu	4	75%
<b>Q3</b> Les vomissements survenus deux heures après le repas ne sont pas de l'allergie alimentaire	5	80%
<b>Q10</b> La gravité de l'allergie alimentaire dépend	6	85%
<b>Q18</b> La noix de pécan croise avec la noix de Grenoble	6	85%
<b>Q5</b> Le Trophatop® pédiatrique est un bon examen de dépistage	8	90%
<b>Q19</b> Le lait Capricare® peut être une alternative chez un allergique au lait de vache	8	90%
<b>Q20</b> Un IgE ovomucoïde < 0,1 ku/l autorise l'ingestion d'oeuf cuit	8	90%
<b>Q4</b> L'œsophagite à éosinophile est un diagnostic uniquement clinique	11	95%
<b>Q6</b> Nommer les examens biologiques utiliser pour le diagnostic d'allergie alimentaire	11	95%
<b>Q7</b> Les prick tests sont réservés aux spécialistes	11	95%
<b>Q13</b> Les allergologues peuvent explorer les allergies alimentaires quel que soit l'âge de l'enfant	11	95%
<b>Q11</b> Il faut attendre l'âge de trois ans pour introduire les arachides	15	100%
<b>Q12</b> La présence d'une urticaire est pathognomonique d'une réaction allergique	15	100%
<b>Q15</b> Le PAI est un document d'expert, et ne peut être rédigé par un pédiatre généraliste	15	100%
<b>Q16</b> La prévalence de l'allergie alimentaire est en forte augmentation	15	100%

## Q1 Prénom

Réponses obtenues : 20    Question(s) ignorée(s) : 0

	PRÉNOM	TOTAL
PRE TEST AA DEC 2025	100.00% 10	50.00% 10
POST TEST AA DEC 25	100.00% 10	50.00% 10
<b>Nombre total de participants</b>	20	20

#	PRE TEST AA DEC 2025	DATE
1	Dominique	12/5/2025 9:18 AM
2	Karina	12/5/2025 9:18 AM
3	Agathe	12/5/2025 9:12 AM
4	Celine	12/5/2025 9:11 AM
5	Sophie	12/5/2025 9:11 AM
6	Charlotte	12/5/2025 9:11 AM
7	Francisco	12/5/2025 9:10 AM
8	Franelle	12/5/2025 9:09 AM
9	Jacky	12/5/2025 9:09 AM
10	sandra	12/5/2025 9:09 AM

#	POST TEST AA DEC 25	DATE
1	Karina	12/6/2025 4:21 PM
2	Charlotte	12/6/2025 4:21 PM
3	Francisco	12/6/2025 4:21 PM
4	Sophie	12/6/2025 4:21 PM
5	Agathe	12/6/2025 4:21 PM
6	sandra	12/6/2025 4:20 PM
7	Jacky	12/6/2025 4:20 PM
8	Franelle	12/6/2025 4:20 PM
9	Dominique	12/6/2025 4:20 PM
10	Céline	12/6/2025 4:18 PM

# Quizz Les allergies alimentaires de l'enfant

## Q2 Nom


Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0

	NOM	TOTAL
PRE TEST AA DEC 2025	100.00% 10	50.00% 10
POST TEST AA DEC 25	100.00% 10	50.00% 10
<b>Nombre total de participants</b>	20	20

#	PRE TEST AA DEC 2025	DATE
1	Baranowski	12/5/2025 9:18 AM
2	Morales	12/5/2025 9:18 AM
3	Labit	12/5/2025 9:12 AM
4	Bonamy	12/5/2025 9:11 AM
5	Moniez	12/5/2025 9:11 AM
6	Tournan	12/5/2025 9:11 AM
7	Funes de la Vega	12/5/2025 9:10 AM
8	COCATRIX	12/5/2025 9:09 AM
9	Cuzzi	12/5/2025 9:09 AM
10	brancato	12/5/2025 9:09 AM
#	POST TEST AA DEC 25	DATE
1	Morales	12/6/2025 4:21 PM
2	Tournan	12/6/2025 4:21 PM
3	Funes de la Vega	12/6/2025 4:21 PM
4	Moniez	12/6/2025 4:21 PM
5	Labit	12/6/2025 4:21 PM
6	brancato	12/6/2025 4:20 PM
7	Cuzzi	12/6/2025 4:20 PM
8	COCATRIX	12/6/2025 4:20 PM
9	Baranowski	12/6/2025 4:20 PM
10	Bonamy	12/6/2025 4:18 PM

### Q3 Les vomissements survenus deux heures après le repas ne sont pas de l'allergie alimentaire


Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 80%	Score moyen 0.8/1.0 (80%)	Écart-type 0.41	Difficulté 5/18
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL
PRE TEST AA DEC 2025	40.00% 4	60.00% 6	50.00% 10
POST TEST AA DEC 25	0.00% 0	100.00% 10	50.00% 10
<b>Nombre total de participants</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>20</b>

## Q4 L'œsophagite à éosinophile est un diagnostic uniquement clinique

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0




■ Vrai ■ Faux

Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes 95%	Score moyen 1.0/1.0 (95%)	Écart-type 0.22	Difficulté 11/18	
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL	
PRE TEST AA DEC 2025	0.00% 0	100.00% 10	50.00% 10	
POST TEST AA DEC 25	10.00% 1	90.00% 9	50.00% 10	
Nombre total de participants	1	19	20	

## Q5 Le Trophatop® pédiatrique est un bon examen de dépistage

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0




■ Vrai ■ Faux

Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 90%	Score moyen 0.9/1.0 (90%)	Écart-type 0.31	Difficulté 8/18
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL
PRE TEST AA DEC 2025	20.00% 2	80.00% 8	50.00% 10
POST TEST AA DEC 25	0.00% 0	100.00% 10	50.00% 10
Nombre total de participants	2	18	20

## Q6 Nommer les examens biologiques utiliser pour le diagnostic d'allergie alimentaire


Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz						
Pourcentage de réponses correctes 95%		Score moyen 1.0/1.0 (95%)		Écart-type 0.22		Difficulté 11/18
	NFSP	✓ IGE SPÉCIFIQUE UNITAIRE	IGE TOTALES	PHADIATOP®	TROPHATOP®	TOTAL
PRE TEST AA DEC 2025	0.00% 0	90.00% 9	30.00% 3	10.00% 1	30.00% 3	80.00% 16
POST TEST AA DEC 25	10.00% 1	100.00% 10	10.00% 1	10.00% 1	0.00% 0	65.00% 13
Nombre total de participants	1	19	4	2	3	20

## Q7 Les prick tests sont réservés aux spécialistes

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0




■ Vrai ■ Faux

Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes 95%	Score moyen 1.0/1.0 (95%)	Écart-type 0.22	Difficulté 11/18	
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL	
PRE TEST AA DEC 2025	10.00% 1	90.00% 9	50.00% 10	
POST TEST AA DEC 25	0.00% 0	100.00% 10	50.00% 10	
Nombre total de participants	1	19	20	



## Q8 Pour traiter un bronchospasme secondaire à une allergie alimentaire j'utilise en premier lieu

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
75%

Score moyen  
0.8/1.0 (75%)


Écart-type  
0.44

Difficulté  
4/18

	UNE CORTICOTHÉRAPIE ORALE	DES BDCA	✓ DE L'ADRÉNALINE IM	UN ANTIHISTAMINIQUE	CELA EST DÙ À SA LATÉRALITÉ À GAUCHE	TOTAL
PRE TEST AA DEC 2025	0.00% 0	50.00% 5	50.00% 5	0.00% 0	0.00% 0	50.00% 10
POST TEST AA DEC 25	0.00% 0	0.00% 0	100.00% 10	0.00% 0	0.00% 0	50.00% 10
Nombre total de participants	0	5	15	0	0	20

## Q9 L'adrénaline n'est pas systématiquement prescrite dans un PAI

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



■ Vrai

■ Faux

■ Cela rassur...

### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes  
70%

Score moyen  
0.7/1.0 (70%)


Écart-type  
0.47

Difficulté  
3/18

	✓ VRAI	FAUX	CELA RASSURE SUR LA BONNE INTELLIGENCE	TOTAL
PRE TEST AA DEC 2025	70.00% 7	30.00% 3	0.00% 0	50.00% 10
POST TEST AA DEC 25	70.00% 7	30.00% 3	0.00% 0	50.00% 10
Nombre total de participants	14	6	0	20

## Q10 La gravité de l'allergie alimentaire dépend


Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz						
Pourcentage de réponses correctes 75%		Score moyen 1.7/2.0 (85%)		Écart-type 0.57		Difficulté 6/18
	✓ DE L'ALLERGÈNE	✓ DE L'ÂGE DE SURVENUE	DU SEXE DE L'ENFANT	DE LA PRÉMATURITÉ	DE L'ECZÉMA ATOPIQUE ASSOCIÉ	TOTAL
PRE TEST AA DEC 2025	80.00% 8	70.00% 7	10.00% 1	10.00% 1	30.00% 3	100.00% 20
POST TEST AA DEC 25	90.00% 9	100.00% 10	0.00% 0	10.00% 1	60.00% 6	130.00% 26
Nombre total de participants	17	17	1	2	9	20

## Q11 Il faut attendre l'âge de trois ans pour introduire les arachides

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0




■ Vrai ■ Faux

Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 100%	Score moyen 1.0/1.0 (100%)	Écart-type 0.00	Difficulté 15/18
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL
PRE TEST AA DEC 2025	0.00% 0	100.00% 10	50.00% 10
POST TEST AA DEC 25	0.00% 0	100.00% 10	50.00% 10
Nombre total de participants	0	20	20

## Q12 La présence d'une urticaire est pathognomonique d'une réaction allergique

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0




■ Vrai ■ Faux

Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 100%	Score moyen 1.0/1.0 (100%)	Écart-type 0.00	Difficulté 15/18
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL
PRE TEST AA DEC 2025	0.00% 0	100.00% 10	50.00% 10
POST TEST AA DEC 25	0.00% 0	100.00% 10	50.00% 10
Nombre total de participants	0	20	20

## Q13 Les allergologues peuvent explorer les allergies alimentaires quel que soit l'âge de l'enfant


Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 95%	Score moyen 1.0/1.0 (95%)	Écart-type 0.22	Difficulté 11/18
	✓ VRAI	FAUX	TOTAL
PRE TEST AA DEC 2025	90.00% 9	10.00% 1	50.00% 10
POST TEST AA DEC 25	100.00% 10	0.00% 0	50.00% 10
<b>Nombre total de participants</b>	19	1	20

## Q14 La DME et la présence d'un eczéma atopique sur le visage sont-elles compatibles

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0




■ Vrai ■ Faux

Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes 40%	Score moyen 0.4/1.0 (40%)		Écart-type 0.50	Difficulté 1/18
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL	
PRE TEST AA DEC 2025	80.00% 8	20.00% 2	50.00% 10	
POST TEST AA DEC 25	40.00% 4	60.00% 6	50.00% 10	
Nombre total de participants	12	8	20	

Q15 Le PAI est un document d'expert, et ne peut être rédigé par un pédiatre généraliste

Réponses obtenues : 20    Question(s) ignorée(s) : 0




■ Vrai    ■ Faux

Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 100%	Score moyen 1.0/1.0 (100%)	Écart-type 0.00	Difficulté 15/18
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL
PRE TEST AA DEC 2025	0.00% 0	100.00% 10	50.00% 10
POST TEST AA DEC 25	0.00% 0	100.00% 10	50.00% 10
Nombre total de participants	0	20	20



## Q16 La prévalence de l'allergie alimentaire est en forte augmentation

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0




■ Vrai ■ Faux

Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes 100%	Score moyen 1.0/1.0 (100%)	Écart-type 0.00	Difficulté 15/18	
	✓ VRAI	FAUX	TOTAL	
PRE TEST AA DEC 2025	100.00% 10	0.00% 0	50.00% 10	
POST TEST AA DEC 25	100.00% 10	0.00% 0	50.00% 10	
Nombre total de participants	20	0	20	

## Q17 L'éviction alimentaire est le seul traitement sûr et efficace

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0




■ Vrai ■ Faux

Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 65%	Score moyen 0.7/1.0 (65%)	Écart-type 0.49	Difficulté 2/18
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL
PRE TEST AA DEC 2025	50.00% 5	50.00% 5	50.00% 10
POST TEST AA DEC 25	20.00% 2	80.00% 8	50.00% 10
Nombre total de participants	7	13	20

## Q18 La noix de pécan croise avec la noix de Grenoble

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0




■ Vrai ■ Faux

Statistiques du quiz			
Pourcentage de réponses correctes 85%	Score moyen 0.9/1.0 (85%)	Écart-type 0.37	Difficulté 6/18
	✓ VRAI	FAUX	TOTAL
PRE TEST AA DEC 2025	90.00% 9	10.00% 1	50.00% 10
POST TEST AA DEC 25	80.00% 8	20.00% 2	50.00% 10
Nombre total de participants	17	3	20

## Q19 Le lait Capricare® peut être une alternative chez un allergique au lait de vache

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0




■ Vrai ■ Faux

Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes 90%	Score moyen 0.9/1.0 (90%)	Écart-type 0.31	Difficulté 8/18	
	VRAI	✓ FAUX	TOTAL	
PRE TEST AA DEC 2025	20.00% 2	80.00% 8	50.00% 10	
POST TEST AA DEC 25	0.00% 0	100.00% 10	50.00% 10	
Nombre total de participants	2	18	20	

## Q20 Un IgE ovomucoïde < 0,1 ku/l autorise l'ingestion d'oeuf cuit

Réponses obtenues : 20 Question(s) ignorée(s) : 0



■ Vrai ■ Faux

Statistiques du quiz				
Pourcentage de réponses correctes 90%	Score moyen 0.9/1.0 (90%)	Écart-type 0.31	Difficulté 8/18	
	✓ VRAI	FAUX	TOTAL	
PRE TEST AA DEC 2025	90.00% 9	10.00% 1	50.00% 10	
POST TEST AA DEC 25	90.00% 9	10.00% 1	50.00% 10	
Nombre total de participants	18	2	20	