


## Résumé du quiz

Score moyen

81% • 19/23 PTS



### Statistiques

Score le plus bas	Médiane	Score le plus élevé
70%	83%	96%

Moyenne: 81%

Écart-type: 7%

### Classement des questions

QUESTIONS (11)	DIFFICULTÉ	SCORE MOYEN
<b>Q4</b> Vision	1	39%
<b>Q12</b> La scoliose.	2	58%
<b>Q13</b> les anomalies des pieds	3	61%
<b>Q9</b> Addiction aux écrans	4	81%
<b>Q11</b> Les pubertés précoces	5	84%
<b>Q3</b> audition	6	95%
<b>Q5</b> troubles d'apprentissage: quand un enfant a des difficultés scolaires	6	95%
<b>Q6</b> Troubles d'apprentissage	6	95%
<b>Q8</b> Les troubles du comportement	6	95%
<b>Q10</b> La puberté normale	6	95%
<b>Q7</b> Le TDAH (Trouble Déficitaire de l'Attention avec Hyperactivité)	11	100%

**Q1 Prénom**

Réponses obtenues : 19    Question(s) ignorée(s) : 0

#	RÉPONSES	DATE
1	Francois	11/28/2025 4:38 PM
2	Yao	11/28/2025 4:36 PM
3	Fadoua	11/28/2025 4:36 PM
4	Marion	11/28/2025 4:36 PM
5	Olivia	11/28/2025 4:35 PM
6	Clemence	11/28/2025 4:35 PM
7	Corinne	11/28/2025 4:35 PM
8	René-Christian	11/28/2025 4:35 PM
9	Rana	11/28/2025 4:35 PM
10	Margot	11/28/2025 4:34 PM
11	Roxana	11/28/2025 4:34 PM
12	Stéphanie	11/28/2025 4:34 PM
13	Thibaut	11/28/2025 4:34 PM
14	Isabelle	11/28/2025 4:34 PM
15	Sophie	11/28/2025 4:33 PM
16	Aurélie	11/28/2025 4:33 PM
17	Binti	11/28/2025 4:33 PM
18	Aïcha	11/28/2025 4:33 PM
19	Lila	11/28/2025 4:32 PM


**Q2 Nom**

Réponses obtenues : 19    Question(s) ignorée(s) : 0

#	RÉPONSES	DATE
1	Lacapere	11/28/2025 4:38 PM
2	Amegnran	11/28/2025 4:36 PM
3	Chaabane	11/28/2025 4:36 PM
4	Delcourt	11/28/2025 4:36 PM
5	Gurdal	11/28/2025 4:35 PM
6	Berthoux	11/28/2025 4:35 PM
7	Petit	11/28/2025 4:35 PM
8	Ntwari	11/28/2025 4:35 PM
9	JAZBA	11/28/2025 4:35 PM
10	Kenigsberg	11/28/2025 4:34 PM
11	Condor	11/28/2025 4:34 PM
12	Eyssette -Guerreau	11/28/2025 4:34 PM
13	Chapon	11/28/2025 4:34 PM
14	Mercanti	11/28/2025 4:34 PM
15	Tizon	11/28/2025 4:33 PM
16	Boisnault Garnier	11/28/2025 4:33 PM
17	Djoumoi	11/28/2025 4:33 PM
18	SOUMAH	11/28/2025 4:33 PM
19	Robin	11/28/2025 4:32 PM

## Q3 audition

Réponses obtenues : 19    Question(s) ignorée(s) : 0




### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 95%	Score moyen 0.9/1.0 (95%)	Écart-type 0.23	Difficulté 6/11
--	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Pour un dépistage auditif, il faut obligatoirement réaliser une audiométrie tonale (avec un casque)	0/1	0.00% 0
✓ Le test à la voix chuchotée doit se faire à voix très basse, non audible à 3 mètres	1/1	94.74% 18
la tympanométrie est obligatoire pour un dépistage de trouble auditif	0/1	10.53% 2
<b>Nombre total de participants: 19</b>		

## Q4 Vision

Réponses obtenues : 19    Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz


Pourcentage de réponses correctes 0%	Score moyen 0.8/2.0 (39%)	Écart-type 0.42	Difficulté 1/11
---	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ Aucun des éléments ci-dessus	1/2	68.42% 13
✓ Un test de Lang II est un test de dépistage de l'hypermétrie	1/2	10.53% 2
la réalisation d'une autoréfractométrie est un bon moyen de dépistage et permet de se dispenser d'une mesure d'acuité visuelle	0/2	10.53% 2
Il est indispensable d'évaluer l'acuité visuelle de près lors d'un dépistage visuel à 9 ans	0/2	15.79% 3

Nombre total de participants: 19

## Q5 troubles d'apprentissage: quand un enfant a des difficultés scolaires

Réponses obtenues : 19    Question(s) ignorée(s) : 0




### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 84%	Score moyen 2.8/3.0 (95%)	Écart-type 0.37	Difficulté 6/11
--	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ il est indispensable d'évaluer la lecture avec un test validé	1/3	89.47% 17
✓ il est indispensable d'évaluer la compréhension de la lecture	1/3	94.74% 18
✓ il est indispensable d'évaluer la qualité du graphisme et de l'écriture	1/3	100.00% 19
<b>Nombre total de participants: 19</b>		

## Q6 Troubles d'apprentissage

Réponses obtenues : 19    Question(s) ignorée(s) : 0




### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 95%	Score moyen 0.9/1.0 (95%)	Écart-type 0.23	Difficulté 6/11
--	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Un enfant dyslexique a le plus souvent des difficultés de latéralisation	0/1	5.26% 1
✓ la dyscalculie est rarement isolée mais doit toujours être recherchée	1/1	42.11% 8
✓ la lenteur à l'école est un des symptômes d'appel du TDC (trouble développemental des coordinations)	1/1	52.63% 10
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>

## Q7 Le TDAH (Trouble Déficitaire de l'Attention avec Hyperactivité)

Réponses obtenues : 19    Question(s) ignorée(s) : 0




### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 100%	Score moyen 2.0/2.0 (100%)	Écart-type 0.00	Difficulté 11/11
---	-------------------------------	--------------------	---------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ Il existe des formes de TDAH sans hyperactivité	1/2	100.00% 19
✓ Devant un enfant TDAH, il faut toujours s'assurer qu'il a des apprentissages normaux	1/2	100.00% 19
Il est indispensable de pratiquer un bilan neuropsychologique pour faire le diagnostic de TDAH	0/2	0.00% 0
<b>Nombre total de participants: 19</b>		

## Q8 Les troubles du comportement

Réponses obtenues : 19    Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz


Pourcentage de réponses correctes 84%	Score moyen 2.8/3.0 (95%)	Écart-type 0.37	Difficulté 6/11
--	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ Devant une hyperactivité d'apparition récente, il faut systématiquement rechercher un harcèlement scolaire	1/3	100.00% 19
✓ Devant une hyperactivité d'apparition récente, il faut systématiquement rechercher une dépression	1/3	100.00% 19
✓ Un trouble du comportement à 8 ans doit systématiquement faire rechercher un trouble du spectre autistique (TSA)	1/3	84.21% 16

Nombre total de participants: 19

## Q9 Addiction aux écrans

Réponses obtenues : 19    Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz


Pourcentage de réponses correctes 58%	Score moyen 2.4/3.0 (81%)	Écart-type 0.77	Difficulté 4/11
--	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ En cas de suspicion d'addiction aux écrans, il faut systématiquement rechercher s'il existe un manque si l'on supprimer les écrans	1/3	84.21% 16
✓ A tout âge, il est déconseillé de laisser des écrans dans la chambre des enfants et adolescents	1/3	100.00% 19
✓ La forme la plus fréquente d'addiction aux écrans est celle liée aux jeux vidéos, en particulier ceux qui se jouent en ligne.	1/3	57.89% 11

Nombre total de participants: 19

## Q10 La puberté normale

Réponses obtenues : 19    Question(s) ignorée(s) : 0




### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 89%	Score moyen 1.9/2.0 (95%)	Écart-type 0.32	Difficulté 6/11
--	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
✓ Le développement mammaire est le signe évocateur de début de la puberté chez la fille	1/2	100.00% 19
Le début de la pilosité pubienne est le signe évocateur de début de la puberté chez le garçon	0/2	10.53% 2
✓ L'échographie pelvienne permet de préciser si le phénomène pubertaire est enclenché chez la fille	1/2	89.47% 17
<b>Nombre total de participants: 19</b>		

## Q11 Les pubertés précoces

Réponses obtenues : 19    Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz


Pourcentage de réponses correctes 68%	Score moyen 1.7/2.0 (84%)	Écart-type 0.48	Difficulté 5/11
--	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Aucun des éléments ci-dessus	0/2	0.00% 0
✓ L'infléchissement statural est souvent le premier signe d'un craniopharyngiome	1/2	68.42% 13
✓ Le caryotype est un examen nécessaire chez toutes les filles situées à - 2DS de leur taille cible	1/2	100.00% 19
En l'absence d'orientation, devant une retard statural, il faut systématiquement faire un dosage de GH de base	0/2	21.05% 4

Nombre total de participants: 19

## Q12 La scoliose.

Réponses obtenues : 19    Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz


Pourcentage de réponses correctes 26%	Score moyen 1.2/2.0 (58%)	Écart-type 0.60	Difficulté 2/11
--	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Pour le suivi d'une scoliose, l'examen de référence est la radiographie standard du rachis, debout (il faut une radio biplanaire qui irradie peu)	0/2	68.42% 13
✓ Une IRM de dépistage de la moelle épinière est recommandée chez les patients présentant une déformation rachidienne précoce et des courbes supérieures à 20°	1/2	36.84% 7
✓ Le diagnostic étiologique d'une scoliose est primordial	1/2	78.95% 15

Nombre total de participants: 19

## Q13 les anomalies des pieds

Réponses obtenues : 19    Question(s) ignorée(s) : 0



### Statistiques du quiz

Pourcentage de réponses correctes 21%	Score moyen 1.2/2.0 (61%)	Écart-type 0.42	Difficulté 3/11
--	------------------------------	--------------------	--------------------

CHOIX DE RÉPONSES	SCORE	RÉPONSES
Quand l'enfant a les pieds en dedans, les semelles orthopédiques (orthèses plantaires) sont intéressantes pour redresser le pied	0/2	0.00% 0
✓ Dans le pied plat, les instabilités du pied ou de la cheville sont des indications des orthèses plantaires	1/2	31.58% 6
✓ En cas de prescription d'orthèse plantaire, celle-ci devra préciser le siège de l'atteinte et les objectifs thérapeutiques justifiant la prescription	1/2	89.47% 17

Nombre total de participants: 19